

## MOBILAT żel 100 g

Cena: 28,95 PLN



### Opis słownikowy

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dawka              | (0,2g+1g+2g)/100g                                       |
| Opakowanie         | 100 g   |
| Postać             | żel   |
| Producent          | STADA ARZNEIMITTEL AG                                   |
| Rodzaj rejestracji | Lek   |
| Substancja czynna  | Heparinoidum, Suprarenali extractum, Acidum salicylicum |

### Opis produktu

**Wskazania** Żel Mobilat to lek stosowany w pourazowych stanach zapalnych stawów i krwiakach oraz przy przeciążeniu ścięgien oraz mięśni. Żel zawiera 3 składniki aktywne. Ekstrakt z kory nadnerczy działa przeciwwysiękowo oraz przeciwzapalnie. Kwas salicylowy ułatwia wnikanie składników do tkanek, a polisaccharan mukopolisacharydu przyspiesza ich regenerację. **Działanie** Lek Mobilat zawiera 3 składniki aktywne o uzupełniającym się działaniu. Ekstrakt z kory nadnerczy działa przeciwzapalnie i przeciwwysiękowo. Efekt ten wspiera kwas salicylowy, ułatwiający penetrację biologicznie czynnych składników żelu do tkanek. Mukopolisacharydowy polisaccharan charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi i miejscowo zmniejszającymi krzepliwość krwi, przez co zwiększa się przepływ tkankowy, a regeneracja tkanek jest szybsza. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Żel stosuje się miejscowo, zewnętrźnie, na skórę. Czas stosowania leku określa lekarz na podstawie rodzaju i przebiegu choroby. Stosowanie żelu Mobilat przez dłuższy czas na większych obszarach powinno być kontrolowane przez lekarza. Zwykle stosowane dawkowanie żelu Mobilat to 1 lub 3 aplikacje dziennie na chorobowo zmienione miejsca. Jedna dawka leku to 5–15 cm pasek żelu delikatnie wmasowanego w chore miejsce. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to one są miejscem leczonym. **Ważne** Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Mobilat jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie stosować leku jeśli pacjent choruje na: ospę wietrzną, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry albo inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła). Lek przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat. **Skład** Substancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisaccharan (Mucopolisaccharidum polisulphatum), ekstrakt z kory nadnerczy (Suprarenal extract) i kwas salicylowy (Acidum salicylicum). 100 g żelu zawiera 0,2 g mukopolisacharydowego polisaccharanu, 1,0 g ekstraktu z kory nadnerczy i 2,0 g kwasu salicylowego. Substancje pomocnicze: disodu edetynian, olejek rozmarynowy, etanoloamina, karbomer, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.