

MUCOPECT KIDS syrop 50 mg/ml 200 ml



Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/ml
Opakowanie	200 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum

Opis produktu

WskazaniaMUCOPECT KIDS syrop 50 mg/ml 200 ml Syrop Mucopect KIDS to lek, którego substancją czynną jest karbocysteina należąca do grupy mukolityków. **Działanie**Preparat jest przeznaczony do leczenia objawowego schorzeń układu oddechowego, które cechuje nadmierne wytwarzanie gęstej oraz lepkiej wydzieliny. Substancja czynna poprzez swoje działanie ułatwia usuwanie flegmy podczas kaszlu. Mucopect KIDS syrop to lek dedykowany dla dzieci od 6 roku życia. **Sposób użycia**Zazwyczaj lek stosuje się następująco: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat Dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to: 15 mL syropu trzy razy na dobę. Po złagodzeniu objawów, dawkę należy zmniejszyć do 10 mL syropu trzy razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mL syropu trzy razy na dobę. Po przyjęciu dawki syropu należy dokładnie zamknąć butelkę. Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem. Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni. **Ważne**Leku Mucopect Kids nie należy stosować: jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli pacjent ma wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy. **Skład**Substancja czynna: jest karbocysteina. 1 mL syropu zawiera 50 mg karbocysteiny. Pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel (E 150d), sacharoza, aromat agrestowy „Aroma grosella 63 2334” (glikol propylenowy, mrówczan etylu, octan izopentylu, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 3-metylobutan-1-ol, gruszlina karbolistny (Barosma betulina) ekstrakt, kwas octowy, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one), sodu wodorotlenek i woda oczyszczona.