

## MUCOVAGIN 10 globulek dopochwowych

Cena: 26,50 PLN



### Opis słownikowy

Producent	VERCO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis

#### MUCOVAGIN 10 globulek dopochwowych

Mucovagin globulki dopochwowe to pierwszy preparat w Polsce zawierający specjalnie dobrany kwas hialuronowy o drobnocząsteczkowej strukturze BASHYAL™.

#### Wskazania

gdy odczuwasz suchość i dyskomfort (pieczenie, napięcie, świąd) w okolicach intymnych gdy odczuwasz ból i dyskomfort podczas stosunku płciowego w okresie menopauzy aby odbudować nabłonek pochwy gdy nie chcesz lub nie możesz stosować hormonalnej terapii zastępczej po porodzie i w trakcie karmienia piersią po zabiegach i operacjach ginekologicznych aby poprawić jakość życia intymnego

#### Działanie

Aktywnym składnikiem jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego. Kwas hialuronowy wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób utworzony film ochronny zapobiega rozwojowi flory patogenicznej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

### Sposób użycia

Terapia standardowa: Zaleca się stosowanie 1 globulki dziennie, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

Terapia wspomagająca: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni lub według wskazań lekarza.

MUCOVAGIN należy używać tylko wewnętrznie, miejscowo do pochwy. Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć ręce.

### Skład

Aktywnym składnikiem globulek dopochwowych jest kwas hialuronowy. Jedna globulka zawiera: kwas hialuronowy (5mg) w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego, masa czopkowa A (glicerydy półsyntetyczne).

Nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych.