

Nebutac 3 - hipertoniczny, 3% roztwór NaCl do inhalacji, 30 ampułek

Cena: 18,90 PLN



Opis słownikowy

CE	0459
Opakowanie	30 amp.a 4ml
Postać	roztwór
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis Nebutac 3 - hipertoniczny, 3% roztwór NaCl do inhalacji NEBUTAC 3 – zastosowanie:

Wyrób medyczny Nebutac 3 to 3% hipertoniczny roztwór chlorku sodu do inhalacji w ampułkach. Przewidziane zastosowanie: pobudza usuwanie wydzieliny w dolnym odcinku dróg oddechowych na skutek osmotycznego działania, na przykład w przypadku: • mukowiscydozy, • rozstrzeni oskrzeli, • zapalenia oskrzelików.

Zapobiega wysuszeniu śluzu oskrzelowego. Hipertoniczny, 3% roztwór chlorku sodu do inhalacji może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi (tłokowymi) lub ultradźwiękowymi.

Sposób użycia

1. Oderwij ampułkę i otwórz ją, odkręcając górną część. 2. Wlej zawartość ampułki do nebulizatora. 3. Przeprowadź inhalację, postępując zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą użytkowania nebulizatora.

Zaleca się stosowanie do inhalacji jednej ampułki jednodawkowej hipertonicznego 3% roztworu chlorku sodu 2–4 razy dziennie.

Składniki

Chlorek sodu: 3 g Woda oczyszczona q.s. 100 ml Produkt nie zawiera konserwantów. Został poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji.

Ważne

NEBUTAC 3 – ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Produkt nadaje się do jednorazowego użytku.
- Powinien być stosowany wyłącznie do inhalacji. Nebutac 3 nie jest roztworem do wstrzykiwań.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie jednodawkowej ampułki. Nie zaleca się używać preparatu w przypadku gdy doszło do jej uszkodzenia.
- Podczas wykonywania inhalacji należy postępować zgodnie z instrukcją użytkownika producenta nebulizatora.
- W razie skłonności do rozwoju duszności lub nadwrażliwości nie wolno stosować roztworu do inhalacji bez nadzoru lekarza.
- Wyrobu medycznego Nebutac 3 nie należy mieszać z innymi lekami.

Jak przechowywać roztwór do inhalacji NEBUTAC 3? Wyrób medyczny przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na etykiecie każdej ampułki.

Po otwarciu jednodawkowej ampułki nie wolno jej używać powtórnie, ponieważ preparat nie zawiera konserwantów. Ponowne użycie ampułki może prowadzić do powstania ryzyka podania zanieczyszczonego roztworu.

Producent

TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.