

NEOFURAGINA 30 tabletek

Cena: 15,49 PLN



Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek



Opis produktu

WskazaniaNEOFURAGINA 30 tabletekLek do stosowania w przypadku zakażenia dolnych dróg moczowych.**Działanie**Lek neoFuragina występuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera furaginę, jako substancję czynną. Furagina jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych**Sposób użycia**Dorośli: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2tabletki) 3 razy na dobę.Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy.Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.Stosowanie u dzieci :Leku neoFuragina nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 miesięcy.**Ważne**Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na furaginę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia np. w przebiegu cukrzycy, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.**Skład**Substancją czynną leku jest furagina (Furaginum). Jedna tabletki zawiera 50 mgfuraginy.Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbata 80, kwas stearynowy.

Galeria



WŁAŚCIWOŚCI

DZIAŁA:

- Bakteriostatycznie
- Łagodnie przeciwgrzybiczo
- Przeciwpierwotniakowo

DZIAŁA OD 1. DNIA STOSOWANIA

MAŁE, WYGODNE DO POKIĘCIĄ TABLETKI

DAWKOWANIE

DOROŚLI

x4 **DZIEŃ 1:** 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę

x3 **OD 2 DNIA:** 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę

SPOSÓB PODAWANIA

Lek doustny, przyjmować podczas posiłków zawierających białko, które zwiększa wchłanianie leku.

Preparat stosuje się przez 7-8 dni.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO neoFuragina, 50 mg, tabletki
 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletki zawiera 50 mg furazydryny (Furazolidinonu), poprzednio stosowana nazwa: furagine. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 18,80 mg, sacharoza 10,00 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. SPOSÓB FARMACEUTYCZNY, tabletki, tabletki białej żółtej (lub żółtopomarańczowej), okrągłe, o jednolitej powierzchni.
 4. SZCZEGÓLNE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Zakażenie dolnych dróg moczowych, 4.3. Przeciwskazania • Nadwrażliwość na substancję czynną (furazydrynę) lub pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. • W pierwszym trymestrze ciąży. • W okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko nieokrwawienia hemolizy u noworodka. • U dzieci i młodzieży. • Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy). • Rozpoznaną polineuropatię, np. cukrzycową. • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o., ul. Emilii Piaśni 23 00-113 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21950 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestru Leków, DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 11.04.2022. Kategoria dostępności OTC. - Produkt dostępny bez przepisu lekarza. Charakterystyka Produktu Leczniczego, dostępna na stronie www.tevamed.pl
 CBS-P1-00062-11-22

Przed przyjęciem zapoznać się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.