

## NO-SPA MAX 80 mg 24 tabletki

Cena: 25,65 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	24 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL LTD.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Drotaverinum

### Opis produktu

**Wskazania**NO-SPA® MAX to lek rozkurczowy z maksymalną dawką substancji czynnej, który pomaga w przypadku bólu brzucha, związanym ze skurczami mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Dzięki temu pozwala szybko odzyskać upragniony komfort.Wskazaniami do stosowania No-Spa Max są:skurcze mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamica dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie okołopęcherzykowe, zapalenie przewodów żółciowych, zapalenie brodawki Vatera;skurcze mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz;Wspomagająco lek stosuje się podczas:skurczy mięśni gładkich przewodu pokarmowego: choroba wrzodowa żołądka oraz dwunastnicy, zapalenie żołądka, zapalenie jelit, trzustki, okrężnicy, stany skurczowe wpustu i odźwiernika żołądka, zespół drażliwego jelita grubego, wzdęcia jelit, zaparcia;bolesne miesiączkowanie.**Działanie**NO-SPA® MAX działa rozkurczowo, uderzając w źródło bólu - skurcz, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej.1 Tym samym NO-SPA® pozwala Ci wrócić do Twoich codziennych zajęć, z dobrym samopoczuciem.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zwyczajnie zalecana dawka wynosi:Dorośli: 1 tabletkę powlekaną 2 lub 3 razy na dobę. Dawka dobową to 120 do 240 mg.Dzieci w wieku powyżej 12 lat ( W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa Forte) : 1 tabletkę powlekaną 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową dla dzieci wynosi 160 mg.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNie należy stosować leku No-Spa Max: jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nerek i serca, jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia, u dzieci poniżej 12 lat.**Skład**Substancją czynną leku jest drotaweryna.Jedna tabletkę powlekaną zawiera 80 mg chlorowodoru drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum).Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk. Otoczka tabletki: Opadry II yellow 85G32207: alkohol poliwinylowy, talk, żółcień chinolinowa lak (E 104), makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), lecytyna (sojowa), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E172)

Galeria



**Czy Ty też robisz ten błąd?**

**62%** Polaków leczy ból brzucha typowymi lekami przeciwbólowymi\*

**na ból brzucha - wybierz leki rozkurczowe**

\*Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Leków (IBL) w ramach projektu "Efektywność i bezpieczeństwo leczenia bólu brzucha u pacjentów z zespołem jelitowo-gastrointestinalnym (ZJG) i zespołem jelitowo-gastrointestinalnym (ZJG) w Polsce".

**Dawkowanie**

**Dorośli:**  
 1x 2-3x na dobę

**Dzieci powyżej 12 r.ż.†**  
 1x 1-2x na dobę

†W przypadku choroby z przewlekłym przebiegiem należy stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

**Uwolnij się!**

- od bólu brzucha
- od bólu menstruacyjnego
- od IBS\*
- od skurczy w obrębie układu pokarmowego

**NOWY FORMAT**

**20 tabl.** → **24 tabl.**

**UWALNIA SIĘ JUŻ W**

**10 MINUT\***

**I USUWA BÓL BRZUCHA<sup>1</sup>**

\*W porównaniu do leków przeciwbólowych.

<sup>1</sup>W porównaniu do leków przeciwbólowych.