

NOLPAZA CONTROL 20mg 14 tabletek refluks, zgaga, wrzody, nadkwaśność

Cena: 4,90 PLN



Opis słownikowy

Producent	KRKA
Rodzaj rejestracji	Lek

UWALNIA OD ZGAGI | 14 TABL.

Opis produktu

WskazaniaKrótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.**Działanie**Tabletka dojelitowa. Jasnobrązowożółta, owalna, obustronnie lekko wypukła tabletka dojelitowa.**Sposób użycia**Dawkowanie: Zalecana dawka to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) na dobę. W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie produktu leczniczego przez kolejne 2 - 3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią ciągu 2 tygodni nieprzerwanego leczenia. Szczególne grupy pacjentów: Dawkowanie - Zalecana dawka to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) na dobę. W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie produktu leczniczego przez kolejne 2 - 3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią ciągu 2 tygodni nieprzerwanego leczenia. Szczególne grupy pacjentów:U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek, lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Dzieci i młodzież: Stosowanie produktu leczniczego Nolpaza control nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Sposób stosowania: Tabletek dojelitowych produktu leczniczego Nolpaza control nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą. U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek, lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Dzieci i młodzież: Stosowanie produktu leczniczego Nolpaza control nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Sposób stosowania: Tabletek dojelitowych produktu leczniczego Nolpaza control nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.**Skład**Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka dojelitowa zawiera 18 mg sorbitolu.

Galeria



Nolpaza®
control 20 mg

- ☑ Łagodzi objawy zgagi
- ☑ Działa przez 24 godziny
- ☑ Wystarczy 1 tabletkę dziennie

Nolpaza®
control 20 mg

Nolpaza control oferuje pełną kontrolę zgagi przez 24 godziny z 1 małą tabletką dziennie^(1,2)



1. Ochrona Półki Produktów Lekowych Nolpaza control 20 mg 07.12.2018
 2. Działanie: Łagodzi objawy zgagi, kontroluje 24 godzinne objawy nie związane z objawami zgagi w postaci wzdęć i odbicia treści pokarmowej. 3005 72 36 46.



Nolpaza®
control 20 mg

WYSOKI
profil
bezpieczeństwa



NISKI potencjał interakcji
z innymi lekami⁽¹⁾

1. Wskazania: P.C. (Białe) N. Pharmaceutics Sp. z o.o. 2014-11-26 20:11:11.
 2. Działanie: N. Pharmaceutics Sp. z o.o. 2014-11-26 20:11:11.



Długotrwała ulga od zgagi

-  1 mała tabletkę dziennie
-  24 godzinna kontrola
-  Bez glutenu

