

# NOVATIV Simeticon Forte 30 kapsułek miękkich

Cena: 11,35 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	CURTIS HEALTH CAPS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Właściwości** Wyrób medyczny Novativ SIMETICON forte przeznaczony jest do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach. Novativ SIMETICON forte przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

**Sposób użycia** Kapsułki Novativ SIMETICON forte stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych. Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

- Dorośli: doraźnie, 1 kapsułka, 2–4 razy dziennie. Maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12 do 18 roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

**Przygotowanie do badań diagnostycznych:**

- Dorośli: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12 do 18 roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Wyrób medyczny może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów. Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Ze względu na działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu, nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawkę pojedynczą można uzupełnić w każdej chwili.

**Ważne Ostrzeżenia**

- Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułek dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia.
- Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinny przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Novativ SIMETICON forte i innych preparatów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyrosyny oraz symetykonu należy zachować 4 godzinny odstęp.
- Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Brak dostępnych danych na temat wpływu wyrobu na obsługę maszyn oraz kierowanie pojazdami.

**Przeciwwskazania** Kiedy nie stosować wyrobu medycznego Novativ SIMETICON forte:

- W przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu,
- U dzieci w wieku poniżej 12 roku życia,
- W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

**Składniki** Symetikon 240 mg w kapsułce miękkiej żelatynowej. Składnikami otoczki są: żelatyna wieprzowa, glicerol. Wyrób medyczny nie zawiera cukru ani barwników.

**Producent** Podmiot

odpowiedzialny i wytwórca: Producent: Medicinæ Sp. z o.o, ul Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Polska Wyprodukowano dla: Medicinæ Sp. z o.o, ul Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Polska