

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg 20 kapsułek

Cena: 14,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	10 kaps.
Postać	kaps.elast.
Producent	RECKITT BENCKISER
Rodzaj rejestracji	Lek

**Szybka ulga
w ostrym bólu**

20 KAPSUŁEK

Opis produktu

WskazaniaNUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg 20 kapsułekLek Nurofen Express Forte jest stosowany w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.**Działanie**Lek Nurofen Express Forte ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Stosować doustnie. Nie należy żuć kapsułek.Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): dawka początkowa 1 kapsułka, popijając wodą, w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas konieczny do zmniejszenia objawów.**Ważne**Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku,jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie,dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.**Skład**Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP, Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna.

Galeria

