

Nurofen Forte pomarańczowy - zawiesina, 100 ml

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy



*dotyczy działania przeciwgorączkowego

**Zaczyna działać
w 15 minut***

100 ML



Cena: 25,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Wskazania Nurofen Forte pomarańczowy

Lek Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach: - gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego), - bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwreżenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, pochodną kwasu propionowego, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie zawiera cukru, barwników i alkoholu, wyposażony w specjalny dozownik o smaku pomarańczowym.

Sposób użycia

Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy 3 razy po 1,25 ml; niemowlęta od 6 do 12 miesięcy 3 do 4 razy po 1,25 ml; dzieci od 1 do 3 lat 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby; dzieci od 4 do 6 lat 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby; dzieci od 7 do 9 lat 3 razy po 5 ml w ciągu doby; dzieci 10 do 12 lat 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby; dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w ciągu doby, do ustąpienia objawów.

Składniki

1ml zawiesiny zawiera 40mg ibuprofenu.

Ważne

Nadwrażliwość na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ.

Galeria

**ODPOWIEDNI
DLA DZIECI
W WIEKU**



**7-12
LAT**

WSKAZANY PRZY:

- gorączce
- bólu o nasileniu małym lub umiarkowanym



1. Strzykawkę mocno wcisnij w otwór w szyjce butelki.
2. Obróć butelkę do góry dnem. Delikatnie odciągnij tłok w dół, naciągnij zawieszynę do właściwego oznaczenia na strzykawce.
3. Ponownie odwróć butelkę i usun strzykawkę, delikatnie ją obracając.
4. Umieść koniec strzykawki w ustach dziecka. Naciśnij powoli tłok i delikatnie podaj dziecku zawieszynę.



**3+
MIESIĄCE**

WARIANT
TRUSKAWKOWY
LUB
POMARAŃCZOWY

STRZYKAWKA
UŁATWIJAJĄCA
DOZOWANIE



**BEZ CUKRU
I SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW**

**PRZYNOŚI ULGĘ
JUŻ W**



**15
minut***

*DOTYCZY DZIAŁANIA PRZECIWGORĄCZKOWEGO

**ULGA W GORĄCZCE
AŻ DO**



**8
godzin***

*DOTYCZY DZIAŁANIA PRZECIWGORĄCZKOWEGO

**9/10
MAM REKOMENDUJE
NA BÓL
PRZY ZĄBKOWANIU***



*BADANIE IQS, CONSUMER JOURNEY 03.2017 W GRUPIE MATEK UŻYWAJĄCYCH NUROFEN DLA DZIECI