

NUROFEN FORTE zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym 50 ml



Cena: 14,49 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Zawiesina dla dzieci

50
ML

Opis produktu

WskazaniaNUROFEN FORTE zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym 50 mlNurofen dla dzieci Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.**Działanie**Ibuprofen występujący w leku Nurofen dla dzieci Forte należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków jest przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.Masa ciała (wiek) Dawka jednorazowa Jak często w ciągu 24 godziny?od 5 kg (3 do 5 miesięcy) 1,25 ml (równowartość 50 mg ibuprofenu) 3 razy7 do 9 kg (6 do 11 miesięcy) 1,25 ml (równowartość 50 mg ibuprofenu) 3 do 4 razy10 do 15 kg (1 - 3 lata) 2,5 ml (równowartość 100 mg ibuprofenu) 3 razy16 do 19 kg (4-5 lat) 3,75 (równowartość 150 mg ibuprofenu) 3 razy20 do 29 kg (6-9 lat) 5 ml (równowartość 200 mg ibuprofenu) 3 razy30 do 40 kg (10-12 lat) 7,5 ml (równowartość 300 mg ibuprofenu) 3 razyLek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte:jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ,jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia),jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie,jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia,jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.**Skład**Substancją czynną leku jest ibuprofen. 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbit 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, aromat truskawkowy (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300), naturalne i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne), woda oczyszczona.

Galeria

**ODPOWIEDNI
DLA DZIECI
W WIEKU**



**7-12
LAT**

**3+
MIESIĄCE**

WARIANT
TRUSKAWKOWY
LUB
POMARAŃCZOWY

STRZYKAWKA
ULATWIAJĄCA
DOZOWANIE

**BEZ CUKRU
I SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW**



WSKAZANY PRZY:

- gorączce
- bólu o nasileniu małym lub umiarkowanym



**PRZYNOŚI ULGĘ
JUŻ W**



**15
minut***

*DOTYCZY DZIAŁANIA PRZECIWGORĄCZKOWEGO

**ULGA W GORĄCZCE
AŻ DO**



**8
godzin***

*DOTYCZY DZIAŁANIA PRZECIWGORĄCZKOWEGO

1. Strzykawkę mocno wcisnij w otwór w szyjce butelki.
2. Obróć butelkę do góry dnem. Delikatnie odciągnij tłok w dół, naciągnij zawieszinę do właściwego oznaczenia na strzykawce.
3. Ponownie odwróć butelkę i usun strzykawkę, delikatnie ją obracając.
4. Umieść koniec strzykawki w ustach dziecka. Naciśnij powoli tłok i delikatnie podaj dziecku zawieszinę.



**9/10
MAM REKOMENDUJE
NA BÓL
PRZY ZĄBKOWANIU***



*BADANIE IQS, CONSUMER JOURNEY 03.2017 W GRUPIE MATEK UŻYWAJĄCYCH NUROFEN DLA DZIECI