

## OCUSEPT krople do oczu hamujące stan zapalny i regenerujące spojówkę oka, 10ml



Cena: 26,00 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml (poj.z syst.dozującym)
Postać	krop.do oczu, roztwór
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis OCUSEPT – krople do oczu

Roztwór oftalmiczny o działaniu hamującym stany zapalne.

OCUSEPT to roztwór oftalmiczny o działaniu hamującym stany zapalne, wspomagający ochronę i regenerację nabłonka rogówki i spojówki. Wskazany jest do stosowania przez dorosłych i dzieci w leczeniu objawów, takich jak **pieczenie, swędzenie, światłowstręt, uczucie ciała obcego i zaczerwienienie oka**, związanych z utrzymującymi się stanami zapalnymi powierzchni oka i powiązanymi schorzeniami takimi jak **zapalenie spojówek**, zapalenie rogówki, zapalenie powiek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie gruczołów tarczowych (Meiboma), uczucie dyskomfortu i zespół suchego oka.

OCUSEPT można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

#### WSKAZANIA DO STOSOWANIA KROPLI DO OCZU OCUSEPT:

OCUSEPT jest wskazany do stosowania jako czynnik wspomagający:

w leczeniu zakażeń spojówek, w leczeniu zakażeń rogówki, w leczeniu zakażeń przydatków oka (brzeży powiek, kanały łzowe, rzęsy), w leczeniu zapalenia spojówek, w leczeniu zapalenia rogówki, w leczeniu zapalenia woreczka łzowego, w profilaktyce przedoperacyjnej.

**Sposób użycia/INSTRUKCJA UŻYWANIA:** Otwórz dozownik zdejmując nasadkę ochronną. Delikatnie ściśnij dozownik i zakropi 1-2 krople. Po użyciu zamknij dozownik.

Pozostały produkt może być używany do 28 dni po pierwszym otwarciu. Można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

**Składniki** Witamina E TPGS, dwuzasadowy fosforan sodu, fosforan sodu jednozasadowy, chlorek sodu, diglukonian chlorheksydyny, woda oczyszczona. **ZAWARTOŚĆ:** Jeden wielodawkowy dozownik 10 ml. **Ważne**

#### OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, do celów okulistycznych. Może być stosowany tylko przez jednego pacjenta. Nie należy go stosować w przypadku znanej nietolerancji lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Podczas aplikacji produktu nie należy dotykać końcówką dozownika oka ani żadnej innej powierzchni. Produktu nie wolno używać, gdy opakowanie przed pierwszym otwarciem jest uszkodzone lub niezamknięte. W razie wystąpienia problemów podczas użytkowania produktu należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych preparatami okulistycznymi zawierającymi fosforany stwierdzano zjawisko mikrozwapnień rogówki. W takich sytuacjach zaleca się korzystanie z produktu wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Przed pierwszym zastosowaniem należy dokładnie przeczytać instrukcję używania. Po zużyciu preparatu należy właściwie zutylizować pojemnik.

#### PRZECHOWYWANIE:

Po każdym zastosowaniu zamknąć dozownik. Pozostały w opakowaniu produkt może być używany do 28 dni po pierwszym otwarciu. Wyrób medyczny przechowywać w temperaturze 2°C – 25°C, w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dz

**Producent** TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

## Galeria



**Pierwsza pomoc w stanach zapalnych oka**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

**ZALECY STOSOWANIA**

- Zmniejsza nieprzyjemne objawy fowori rzasce zapalenia spojówek (pieczenie, swędzenie, uczucie ciała obcego i zaczerwienienie oka)
- Nie szczyplie. Jest dobrze tolerowany
- Dostępny bez recepty



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

**JAK STOSOWAĆ**

**1-2 krople** do worka spojówkowego

**DLA KOGO KROPLE DO OCZU**

**NA STAN ZAPALNY?**

- Dla dorosłych i dzieci
- Dla osób noszących soczewki kontaktowe wielokrotnego użytku



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

OCUSEPT jest wskazany do stosowania jako czynnik wspomagający:

- w leczeniu zakażeń spojówek
- w leczeniu zakażeń przydatków oka (brzozi powiek, kanały łzowe, rzęsy)
- w leczeniu zapalenia spojówek
- w leczeniu zapalenia rogówki
- w leczeniu zapalenia woreczka łzowego
- w profilaktyce przedoperacyjnej



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.