

## OKTASEPTAL aerozol na skórę 250 ml



Cena: 23,49 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	(0,1g+2g)/100g
Opakowanie	250 ml
Postać	aer.na skórę, roztwór
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Oktenidini dihydrochloridum, Phenoxyetha

### Opis produktu

**Wskazania**Oktaseptal jest przeznaczony do stosowania na niezbyt rozległe rany i dowlokrotnego krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi oraz przed i po niedużych zabiegach operacyjnych (np. w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.):•do leczenia antyseptycznego niezbyt rozległych ran oraz dezynfekcji skóry i błon śluzowych•do dezynfekcji jamy ustnej np. przy aftach, podrażnieniu spowodowanymnoszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej•przy leczeniu drobnych ran oparzeniowych i owrzodzeniowych•przy pielęgnacji nierozległych ran i szwów pooperacyjnych•przed i po badaniach diagnostycznych w obrębie żeńskich i męskich narządów płciowych, w tym pochwy, sromu, żołądki prącia•przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie (m.in. do pielęgnacji krocza po jego nacięciu w trakcie porodu - episiotomii)•przed i po zabiegach diagnostycznych w obrębie odbytu•przed i po cewnikowaniu pęcherza moczowego•przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem•u dzieci (m.in. do pielęgnacji kikutu pępownego)•do ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybic międzypalcowej**Działanie**Oktaseptal zawiera dwie substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.Lek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.Działanie leku Oktaseptal występuje po minucie od zastosowania i utrzymuje się mniej więcej przez godzinę.Oktenidyny dichlorowodorek działa na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanoluzupełnia zakres działania oktenidyny dichlorowodoru przenikając do głębszych warstw skóry i błon śluzowych.**Sposób użycia**Droga podania: podanie na skórę.Lek należy stosować w postaci nierozcieńczonej.Dezynfekcja skóry i błon śluzowychNasączyć jałowy gazik lekiem Oktaseptal i dokładnie przemywać miejsca, które mają być poddane zabiegowi. Po dokładnym zwilżeniu lekiem skóry lub błon śluzowych należy odczekać minimum 1 minutę (można wydłużyć czas do 5 minut). Jeśli lekarz zaleci, można rozpylić lek Oktaseptal bezpośrednio na skórę lub błony śluzowe. Należy równomiernie zwilżyć lekiem całą powierzchnię i pozostawić na co najmniej 1 minutę.Dezynfekcja jamy ustnejJamę ustną należy płukać ilością 20 ml leku przez 20 sekund. Nie należy dopuścić do połknięcia leku (patrz także w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane).Leczenie drobnych ran oparzeniowych, lub ran powstałych w przebiegu chorób układowych (cukrzyca, miażdżycza itp.)Lek Oktaseptal należy stosować w postaci przymoczek (jałowe gaziki nasączone lekiem). Gaziki należy zmieniać raz lub dwa razy na dobę.Pielęgnacja ran i szwów pooperacyjnychLek działa odkażająco oraz znieczulająco. Oczyszcza rany z martwych tkanek i wydzieliny, stymulując proces gojenia. Jałowy gazik należy nasączyć lekiem Oktaseptal i przemywać od środka na zewnątrz rany (a nie odwrotnie).Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, także grzybicy międzypalcowej stópLek należy rozpylać na chore powierzchnie skóry rano i wieczorem przez 14 dni.**Ważne**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**Skład**Substancjami czynnymi

leku są oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.100 g aerozolu na skórę, roztworu zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodorkui 2,00 g fenoksyetanolu.Pozostałe składniki to: glicerol 85%, sodu D-glukonian, betaina kokamidopropylowa 30%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona