

OLEJ RYCYNOWY płyn doustny 30 g PROLAB



Cena: 3,35 PLN

Opis słownikowy

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

OLEJ RYCYNOWY płyn doustny 30 gram

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania doustnego przy zaparciach.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania doustnego zaparciach.

Działanie

Lek jest tradycyjnie stosowany jako środek przeczyszczający.

Pod wpływem lipazy trzustkowej w obecności kwasów żółciowych następuje enzymatyczny rozpad oleju do gliceryny i nienasyconego kwasu rycynolowego, który ulega stopniowemu zmydleniu do mydeł sodowych i potasowych. Kwas i mydła drażnią jelita. Wzmagają one ruchy perystaltyki jelita grubego. Wywołują lekkie przekrwienie ścian jelita, zwiększają przenikanie wody przez ściany jelita. Wzmagają się wydzielanie gruczołów trawiennych połączone z upłynnieniem treści jelitowej. Po upływie 2-6 godzin od chwili podania oleju następuje

wypróżnianie.

Sposób użycia

Stosować doustnie.

Dzieci powyżej 12 roku życia: jednorazowo 1-2 łyżeczek (co odpowiada 4-8 g).

Dorośli: jednorazowo 1-2 łyżek (co odpowiada 12-24 g)

Skład

100 g płynu zawiera:

olej rycynowy 100 g

Ważne

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długiego okresu stosowania.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na olej rycynowy. Choroby zapalne przewodu pokarmowego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wypróżnienie następuje po około 2-3 godzinach od podania preparatu.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Pacjenci z niedrożnością jelit, z stanami zapalnymi narządów jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, z bólami brzucha o niejasnej etiologii nie powinni przyjmować oleju rycynowego. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Lek stosować doraźnie, w przypadku nie ustąpienia objawów zaparcia skontaktować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na działanie przeczyszczające oleju rycynowego, nie zaleca się przyjmowania jednocześnie innych leków, należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu przed zastosowaniem innych leków.

Ciąża i laktacja

Olej rycynowy powoduje przekrwienie narządów jamy brzusznej, dlatego jego stosowanie w czasie ciąży jest niewskazane. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wykonano dotychczas badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń

Brak danych na temat wpływu oleju rycynowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie niepożądane:

Podrażnienia jelita cienkiego, przekrwienia jelita grubego i narządów w obrębie miednicy; u osób szczególnie wrażliwych olej rycynowy może wywołać wysypkę.

Przedawkowanie

Po dawkach znacznie większych niż zalecane mogą nastąpić: mdłości, wymioty, kolka, biegunka, zachwianie równowagi elektrolitycznej organizmu.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Olej rycynowy jest stosowany od wielu lat u ludzi. Brak danych przedklinicznych o bezpieczeństwie.