

OLFEN MAX żel 0,02 g/g 150 g

Cena: 35,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	150 g
Postać	żel
Producent	TEVA B.V.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum

Opis produktu

WskazaniaOLFEN MAX żel 0,02 g/g 150 gDorośli i młodzież w wieku od 14 lat Miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych nadwyrażeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępyimi urazami. U młodzieży w wieku od 14 lat przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.**Działanie**Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyřeżeń lub stłuczeń); ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Olfen Max stosuje się zewnątrznie, na skórę. Zależnie od powierzchni leczonego miejsca wymagane jest od 1 g do 4 g żelu, czyli w ilości odpowiadającej wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego. Aplikacja leku polega na naniesieniu cienkiej warstwy żelu na wymagającą leczenia powierzchnię ciała i delikatnym wmasowaniu w skórę. Następnie należy umyć ręce (chyba że to one są miejscem leczonym).Dawkowanie Olfenu Max u dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat to aplikacja żelu 2 razy dziennie(najlepiej rano oraz wieczorem). Maksymalna dawka dobową to 8 g żelu.Okresl eczenia zależy od objawów i choroby podstawowej. Leku Olfen Max nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień bez konsultacji z lekarzem. W przypadku nasilenia objawów chorobowych lub braku poprawy w ciągu 3 – 5 dni stosowania należy skonsultować się z lekarzem.**Ważne**PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiły reakcje nadwrażliwości, takie jak astma, skurcz oskrzeli, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne, a także na skórę z egzemą i błonę śluzową; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Teva B.V.Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandia.Nr Certyfikacji: OLF-PL-00107/06/2021**Skład**Substancją czynną leku jest diklofenak.1 g żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy (E 1520), kozozylokapyrokaponian, parafina ciekła, karbomer, makroglu eter cetostearylowy, dietyloamina, kwas oleinowy, butylohydroksytoluen (E 321), substancja zapachowa (zawierająca cytronelol, geraniol, alkohol benzyłowy, linalol, limonen, cytral, farnesol, kumarynę i eugenol), woda oczyszczona.

