

ORASEPTAN aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 ml (DEZAFTAN)



Cena: 20,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(2,9mg+1,96mg+25,6mg)/ml
Opakowanie	30 ml (atomiz.)
Postać	aer.do st.w j.ustnej
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Cetylpirydinium chloride, Lidocainum hydrochloridum, Zinci gluconas

Opis produktu

WskazaniaORASEPTAN aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 mlOraseptan zalecany jest do stosowania:w stanach zapalnych jamy ustnej;w zapaleniu dziąseł;w zakażeniach i owrzodzeniach błony śluzowej jamy ustnej (afte, pleśniawki), w tym wynikających z urazów wywołanych przez aparaty ortodontyczne i protezy dentystyczne.**Działanie**Oraseptan to lek antyseptyczny i miejscowo znieczulający, działający na problemy występujące w jamie ustnej – stany zapalne, zapalenia dziąseł, afte, czy mechaniczne urazy.Oraseptan szybko znieczula bolące miejsce (działa już od 1. minuty), działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo.Dzięki aplikatorowi jest wygodny w użyciu i trafia dokładnie w bolące miejsce.**Sposób użycia**Dorośli: stosować po 3 dawki aerozolu co 1 lub 2 godziny.Nie stosować częściej niż 8 razy na dobę.Dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosować po 3 dawki aerozolu co 2 lub 3 godziny.Nie stosować częściej niż 6 razy na dobę.Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Sposób podawaniaProdukt leczniczy stosuje się miejscowo na błonę śluzową jamy ustnej.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na substancje czynne, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub naktórąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.Ciężka niewydolność wątroby lub nerekWrodzona lub idiopatyczna methemoglobinemiaDzieci w wieku poniżej 6 latMyasthenia gravis**Skład**Substancja czynna1 ml aerozolu zawiera: 2,9 mg cetylpirydyniowego chlorku, 1,96 mg lidokainy chlorowodoru i 25,6 mg cynku glukonianu (co odpowiada 3,7 mg jonów cynku).