

OROFAR MAX 20 pastylek

Orofar Max

20
pastylek

Cena: 14,50 PLN



Opis słownikowy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

Wskazania

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach.

Dawkowanie

Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej.

Nie należy jej żuć ani połykać.

Nie należy stosować preparatu Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu.

Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu.

Maksymalna dawka dobową: nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie należy stosować preparatu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować preparatu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Preparatu Orofar MAX nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.

Jeżeli objawy nadal utrzymują się lub dołącza się do nich gorączka, zawroty głowy, nudności lub wymioty, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza.

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Ze względu na zawartość sorbitolu preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach zgłaszano nudności, wymioty oraz przemijające objawy podrażnienia jamy ustnej i gardła.

Odnotowywano pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, takich jak wysypka skórna w związane ze stosowaniem substancji czynnych preparatu Orofar MAX.