

ORTANOL MAX 20 mg 14 kapsułek dojelitowych KOD2D

Cena: 9,83 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Opakowanie	14 kaps.
Postać	kaps.dojel.
Producent	SANDOZ GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Omeprazolum

Opis produktu

WskazaniaTwarde kapsułki dojelitowe Ortanol MAX wskazane są do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: zgaga i kwaśne odbijanie (zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej). Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.**Działanie**Lek Ortanol MAX to przyjmowane doustnie kapsułki dojelitowe, których substancją czynną jest omeprazol. Jedna kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg omeprazolu. Omeprazol to lek z grupy tzw. inhibitorów pompy protonowej, który jest wchłaniany szybko z jelita, a jego działanie utrzymuje się nawet przez całą dobę. Omeprazol działa na komórki okładzinowe w żołądku i hamuje wydzielanie przez nie kwasu solnego, co pozwala na uniknięcie takich nieprzyjemnych dolegliwości, jak: kwaśny posmak w ustach, odbijanie się, ból w przełyku, pieczenie oraz cofanie się treści żołądkowej. Wystarczy przyjmować tylko jedną kapsułkę Ortanolu MAX dziennie, aby walczyć z objawami refluksu, takimi jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej.**Sposób użycia**Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z ulotką dla pacjenta dołączoną do leku. Lek stosuj zawsze zgodnie z ulotką lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyjmowania lub dawkowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.Przyjmuj jedną kapsułkę leku na objawy refluksu Ortanol MAX (20 mg omeprazolu) raz dziennie, najlepiej rano. Kapsułki przyjmuj podczas posiłku lub na czczo. Kapsułki połykaj w całości, popijając szklanką wody. Nie żuj ich ani nie zgniataj.Zwyczajnie Ortanol MAX stosuje się przez 14 dni. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktuj się z lekarzem. W celu złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez kolejne 2 lub 3 dni.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Ortanol MAX:jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol);jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).**Ostrzeżenia i środki ostrożności**Nie przyjmuj leku Ortanol MAX przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W razie braku poprawy oraz w razie nasilenia objawów zgłoś się po poradę do lekarza. Ortanol MAX może maskować objawy innych chorób, dlatego jeśli przed lub w trakcie jego stosowania wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów lub stanów, niezwłocznie zwróć się do lekarza:nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;ból żołądka lub niestrawność;wymioty, również krwawe;smoliste stolce (również z domieszką krwi);ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż stosowanie omeprazolu może wiązać się z niewielkim ryzykiem wystąpienia biegunki zakaźnej;stwierdzone wcześniej owrzodzenie żołądka lub przebyte zabiegi chirurgicznego przewodu pokarmowego;stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;żółtaczką lub ciężką chorobą wątroby;wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.Ciąża i karmienie piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed

zastosowaniem tego leku. **Skład** Substancją czynną leku na objawy refluksu bez recepty Ortanol MAX jest omeprazol. Jedna kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Pozostałe składniki leku to: sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu laurylosiarczan, magnezu tlenek ciężki, talk, kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).