

OSCILLOCOCCINUM 30 dawek BOIRON



Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

OSCILLOCOCCINUM® granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5oC), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

OSCILLOCOCCINUM granulki w pojemniku jednodawkowym. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Przeciwwskazania

Leku OSCILLOCOCCINUM® nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ważne

Stosowanie leku u dzieci: przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku z jedzeniem i pićem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek OSCILLOCOCCINUM® zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, OSCILLOCOCCINUM® granulki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przechowywanie leku

Bez specjalnych wymagań.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku OSCILLOCOCCINUM® po upływie terminu

ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Dawkowanie

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku OSCILLOCOCCINUM® to:

Dorośli i dzieci od 6 roku życia:

- Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

- Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Dzieci poniżej 6 roku życia: według wskazań lekarza.

Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się lekarzem. W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku OSCILLOCOCCINUM®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku OSCILLOCOCCINUM® granulki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

1 g granulek zawiera:

Substancja czynna:

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.