OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

OTTILAN MED krople do uszu 15 ml

Cena: 17,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 ml
Postać	krop.do uszu
Producent	SIMPLY YOU NOVASCON SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościKrople OTTILAN MED - wyrób medyczny wspomaga leczenie stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego spowodowanych przez infekcje różnego pochodzenia.Preparat pomaga łagodzić najczęstsze objawy zapalenia ucha zewnętrznego takie jak ból i obrzęk, świąd, uczucie napięcia skóry i zatkania/osłabienia słuchu.Zawarty w wyrobie medycznym glicerol usuwa nadmiar płynu z tkanek przewodu słuchowego zewnętrznego (efekt osmotyczny) powodując zmniejszenie obrzęku i towarzyszącego mu bólu ucha oraz tworzy barierę ochronną na powierzchni skóry.Obecne w produkcie nanokoloidy srebra o silnym działaniu utleniającym powodują obumarcie drobnoustrojów, a zawarte w wyrobie nanokoloidy miedzi zapobiegają ich rozwojowi.**Sposób użycia**Wyrób medyczny OTTILAN MED w postaci kropli stosuje się u dzieci (powyżej 12 miesiąca) i osób dorosłych do przewodu słuchowego zewnętrznego. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem wyrobu należy przeczytać uważnie całą instrukcję użycia dołączoną do opakowania ponieważ zawiera ona ważne informacje.Dawkowanie (dzieci i osoby dorosłe):Podawać do bolącego ucha 1-2 krople wyrobu medycznego maksymalnie trzy razy na dobę.Ból ucha powinien zmniejszyć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia stosowania wyrobu medycznego OTTILAN MED. W przypadku braku poprawy w ciągu 3 dni lub w razie nasilenia się dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W razie konieczności i wyłącznie po konsultacji z lekarzem wyrób medyczny można stosować przez dłuższy czas.**Ważne**Nie należy stosować wyrobu medycznego OTTILAN MED:w przypadku nadwrażliwości na glicerol, lub którąkolwiek z zawartych substancji;w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia błony bębenkowej*;w przypadku krwawienia lub wycieku z ucha;w przypadku odczuwania silnego ból ucha wraz z pogorszeniem słuchu;u niemowląt poniżej 12 miesięcy;nie stosować u osób bezpośrednio po zabiegach operacyjnych w obrębie ucha. W tych przypadkach możliwość stosowania OTTILANU MED należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem laryngologiem.do ucha z założonym aparatem słuchowym. Ottilan MED należy podawać na około godzinę przed włożeniem aparatu słuchowego do przewodu słuchowego zewnętrznego.*O uszkodzeniu błony bębenkowej mogą świadczyć m.in. ostry ból w uchu (stopniowo malejący), szumy w uszach (które mogą świadczyć o uszkodzeniu głębiej położonych struktur ucha), niedosłuch, zawroty głowy oraz (lub) wyciek z ucha. W przypadku występowania któregokolwiekz ww. objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. U osóbz perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania wyrobu może dojść do uszkodzenia słuchu.**Składniki**Glicerol, nanokoloid srebra, nanokoloid miedzi