

PANAPREX 500 mg paracetamol 500 mg 50 tabletek OLIMP

Cena: 5,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	OLIMP LABORATORIES
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

WskazaniaLek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.**Działanie**Substancją czynną leku jest paracetamol należący do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Lek jest wskazany w leczeniu gorączki (w przeziębieniu, grypie) oraz w objawowym leczeniu bólu różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Panaprex wykazuje działanie przeciwbólowe w leczeniu bólów takich jak: bóle głowy, migrena, bóle kości i stawów, bóle mięśni, bóle pleców, bóle zębów, bóle pooperacyjne, bolesne miesiączkowanie, ból gardła. Jeśli po upływie 3 dni leczenia bólu lub gorączki nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.**Sposób użycia**Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):Doustnie, 1 do 2 tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 4 g (8 tabletek).Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 - 50 kg):Doustnie, 1 tabletkę jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 6 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 3 g (6 tabletek).Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej.Należy stosować najniższą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres.Tabletki należy połykać popijając wodą.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Panaprexjeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,u dzieci w wieku poniżej 12 lat,jeżeli u pacjenta występuje choroba alkoholowa.**Skład**Co zawiera lek PanaprexSubstancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, powidon K90, woda oczyszczona, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumarat), otoczka Opadry 200 White (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu węglan).