

## PARACETAMOL Zentiva 500 mg 50 tabletek

Cena: 6,89 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabl.
Producent	ZENTIVA K.S.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Paracetamolium

### Opis produktu

**Wskazania**Lek Paracetamol Zentiva 500 mg jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 21 kg (w wieku 6 lat i powyżej).Jeśli po upływie 3 dni (w przypadku gorączki) lub 5 dni (w przypadku bólu) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy powiedzieć o tym lekarzowi.Nie należy podawać leku dzieciom dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.**Działanie**Lek Paracetamol Zentiva, tabletki jest stosowany w krótkotrwałym, objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takiego jak: ból głowy, ból zębów, ból menstruacyjny, ból mięśni i stawów podczas grypy i przeziębienia, i (lub) w celu obniżenia gorączki.**Sposób użycia**Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.Dawkę paracetamolu ustala się na podstawie masy ciała i wieku, dawka jednorazowa zwykle wynosi 10 do 15 mg/kg masy ciała, maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała.6 do 8 lat (21 do 24 kg): ½ tabletki (250 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin9 do 10 lat (25 do 32 kg): ½ tabletki (250 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin.10 do 12 lat (powyżej 33 kg): 1 tabletki (500 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin.12 do 15 lat: 1 tabletki (500 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin.Powyżej 15 lat: 1 do 2 tabletek (500 do 1000 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin.**Ważne**Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta:stwierdzono nadwrażliwość na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekuwystępuje ciężka niewydolność wątroby,występuje ostre zapalenie wątroby.**Skład**Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletki zawiera 500 mg paracetamolu.Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana żelowana, skrobia kukurydziana, talk (E 553), kwas stearynowy (E 1201), potasu sorbinian (E 202).**Dawkowanie**Wiek Masa ciała Dawkowanie Maksymalna dawkadobowa6 do 8 lat 21 do 24 kg ½ tabletki (250 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin 2,5 tabletki (1,25 g)9 do10 lat 25 do 32 kg ½ tabletki (250 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin 3 tabletki (1,5 g)10 do 12 lat powyżej 33 kg 1 tabletki (500 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin 4 tabletki (2 g)12 do 15 lat 34 do 60 kg 1 tabletki (500 mg) w razie potrzeby,w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin 6 tabletek (3 g)powyżej 15 lat 34 do 60 kg 1 tabletki (500 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin 6 tabletek (3 g)powyżej 15 lat powyżej 60 kg 1 do 2 tabletek (500 do 1000 mg) w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin 6 tabletek (3 g)\*\* Maksymalną dawkę dobową 8 tabletek (4 g) mogą przyjmować wyłącznie pacjenci z masą ciała powyżej 60 kg po konsultacji lekarskiej.