

DOMOWA APTECZKA Pastyłki z porostem islandzkim, 30past. do ssania

Cena: 18,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 pastyl.
Postać	-
Producent	DOMOWA APTECZKA
Rodzaj rejestracji	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Domowa Apteczka Pastyłki z porostem islandzkim nawilżają i przynoszą ulgę przy suchości gardła

Zastosowanie: Dzięki obecności w produkcie wyciągu z porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia oraz przynosi ulgę przy suchości gardła. Ochronna warstwa wspiera prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej, zwiększa komfort przełykania a także zabezpiecza przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak suche lub zimne powietrze. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafią bezpiecznie ssać pastylkę: 2 pastylki dziennie. Dzieci 7-12 lat: 3 pastylki dziennie. Młodzież i osoby dorosłe: 6 pastylek dziennie.

Składniki

substancja żelująca: guma arabska (guma akacjowa), substancja słodząca: sorbitole, ekstrakt z porostu islandzkiego (*Cetraria islandica* L. Ach.), substancja słodząca: maltitole, wyciąg korzenia prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis* L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancja glazurująca: wosk pszczeli biały i żółty, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Składniki w porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia: 2 / 3 / 6 pastylek Ekstrakt z porostu islandzkiego *Cetraria islandica* (L.) Ach 200 mg / 300 mg / 600 mg Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego *Althaea officinalis* (L.) 100 mg / 150 mg / 300 mg Witamina C 24 mg (30% RWS) / 36 mg (40% RWS) / 72 mg (90% RWS) 1% RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Ważne

Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po spożyciu pastylki. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie łączyć bezpośrednio z lekami. W przypadku stosowania leków należy zachować odstęp przynajmniej dwóch godzin między zażyciem leku i spożyciem preparatu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.