

Phlebodia 600 mg, 60 tabletek powlekanych

Cena: 66,65 PLN



Opis słownikowy

Dawka	600 mg
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	MYLAN SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Opis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Phlebodia 600 mg, tabletki powlekane Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. – Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. – Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. – Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje

Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych. **Wskazania:** Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała. Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

Kiedy nie przyjmować leku Phlebodia – jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). **Ostrzeżenia i środki ostrożności** Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Phlebodia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. **Ostrzeżenia** – jeśli dyskomfort i łamliwość włóscinek nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem – jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu utrzymują się po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. **Środki ostrożności** Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy unikać

nadmiernej ekspozycji na słońce, wysokich temperatur, długiego stania, nadwagi. Noszenie odpowiednich pończoch uciskowych wspomaga prawidłowe krążenie krwi. **Dzieci i młodzież** Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat). **Lek Phlebodia a inne leki** Istotne kliniczne interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. **Ciąża i karmienie piersią** Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ciąża Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie. **Karmienie piersią** W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią. **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn** Brak lub nieznaczny wpływ. **Lek Phlebodia zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (E 124)** Lek zawiera czerwień koszenilową A, pąs 4R (barwnik azowy), który może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Phlebodia

Ten lek należy zawsze przyjmować według zaleceń lekarza lub farmaceuty. **Dawkowanie** Dorośli (w wieku od 18 lat) **Zalecana dawka w:** - niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletkę na dobę. - żylakach odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem. **Sposób stosowania** Podanie doustne. Należy połknąć tabletkę popijając połową szklanki wody. **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Phlebodia** Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Pominięcie przyjęcia leku Phlebodia** Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. **Przerwanie przyjmowania leku Phlebodia** Brak danych na temat skutków przerwania leczenia. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) - bóle żołądka. Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) - reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy lub gardła - zdęcia - biegunka - zaburzenia trawienia - mdłości. Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) - wymioty. Zaburzenia trawienia rzadko prowadzą do zaprzestania leczenia. **Zgłaszanie działań niepożądanych** Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl> Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Phlebodia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) i blisterze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phlebodia - Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletkę zawiera 600 mg diosminy. - Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerazol R 972), celuloza mikrokrystaliczna. **Otoczka:** 1. Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400, stearynian. 2. Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszenilowa A, pąs 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172). 3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), воск Carnauba (E 903), воск pszczeli (E 901). **Jak wygląda lek Phlebodia i co zawiera opakowanie** Opakowanie zawiera 15, 30 lub 60 tabletek powlekanych. **Podmiot odpowiedzialny** LABORATOIRES INNOTHERA 22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil Francja **Wytwórca** INNOTHERA CHOUZY Rue Rene Chantereau - Chouzy-sur-Cisse 41150 Valloire-sur-Cisse Francja **W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:** Mylan Healthcare Sp. z o.o. tel. 22 546 64 00