

PIROLAM INTIMA VAG tabletki dopochwowe 0,5 g 1 sztuka

LEK

Cena: 22,75 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	1 tabl.
Postać	tabl.dopoch.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Clotrimazolum

Opis produktu

Opis

Pełna kuracja = 1 opakowanie = 1 tabletki dopochwowa

1 tabletki dopochwowa leczy i usuwa objawy infekcji intymnej

- co to za lek i jak się go stosuje?

To lek na **grzybicze infekcje intymne** (grzybicę pochwy i zewnętrznych żeńskich narządów płciowych) w postaci tabletki dopochwowej. Ekspresowa terapia dla kobiet, którym zależy na jak najszybszym leczeniu i wygodzie stosowania.

Pirolam Intima Vag można stosować powyżej 16. roku życia (powyżej 12. roku życia pod nadzorem lekarza)¹.

Najczęstsze objawy **grzybiczej infekcji intymnej**:

Leczenie infekcji intymnej trzeba rozpocząć jak najszybciej. Objawy są bardzo dokuczliwe i wymagają natychmiastowego działania.

pieczenie

ból

swędzenie

upławy

Wybierz **Pirolam Intima Vag!**

Usuwa najczęstsze objawy infekcji intymnej:

świąd i upławy, pieczenie, ból.

Dostępny bez recepty

Pełna kuracja

= 1 tabletkę dopochwową = 1 opakowanie

MAXymalna dawka klotrymazolu w jednej tabletkę

Zapoznaj się z **informacjami o produkcie**

Co to jest lek Pirolam Intima Vag i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Pirolam Intima Vag jest klotrymazol, który należy do grupy leków zwanych imidazolami. Ma szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego, to znaczy niszczy grzyby i hamuje ich wzrost. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich jak: dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

Lek Pirolam Intima Vag stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy i sromu (żeńskich zewnętrznych narządów płciowych) wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Nie należy samodzielnie stosować leku jeśli inne doustne leki przeciwgrzybicze były nieskuteczne podczas leczenia obecnej infekcji.

Jak stosować lek Pirolam Intima Vag

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat – Jedna tabletkę dopochwowa, głęboko dopochwowo, przed snem. Lek stosuje się w dawce jednorazowej. Tabletkę dopochwowa powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe.

Należy zapewnić wilgotne środowisko pochwy, aby tabletki rozpuściła się całkowicie. W przeciwnym wypadku nierozpuszczone części tabletki mogą wyslizgnąć się z pochwy.

Nie należy stosować leku Pirolam Intima Vag w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego leku przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

Partner seksualny powinien jednocześnie zostać poddany leczeniu przeciwgrzybiczemu.

Czas trwania leczenia Lek Pirolam Intima Vag stosowany jest do leczenia w dawce jednorazowej.

W przypadku braku znaczącej poprawy **po 7 dniach** od zastosowania, należy **skonsultować się z lekarzem** w celu potwierdzenia przyczyny infekcji. W przypadku pogorszenia objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie należy stosować leku Pirolam Intima Vag u dziewcząt w wieku poniżej 16 lat bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Jak przechowywać lek Pirolam Intima Vag

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pirolam Intima Vag Substancją czynną leku jest klotrymazol. Każda tabletki dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu. Pozostałe substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Pirolam Intima Vag i co zawiera opakowanie Lek Pirolam Intima Vag 500 mg ma postać tabletki dopochwowej barwy białej, obustronnie wypukłej, o kształcie wydłużonym, z jednej strony zaokrąglonej, z drugiej strony prostej ściętej. Opakowanie: blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierający 1 tabletkę dopochwową.

Dotyczy leku Pirolam® Intima Vag:

Pirolam® Intima Vag. Skład i postać: 1 tabletkę dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu. **Wskazania:** Leczenie infekcji pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol. **Podmiot odpowiedzialny:** ZF POLPHARMA S.A. www.polpharma.pl. ChPL: 23.07.2021 r.

1. U młodzieży w wieku poniżej 16 lat, Pirolam Intima Vag można stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych. Źródło: charakterystyka produktu leczniczego Pirolam Intima Vag.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

PIR-I/036/05-2022

WskazaniaPIROLAM INTIMA VAG tabletki dopochwowe 0,5 g 1 sztuka

lek na grzybicze infekcje intymne . Leczenie infekcji pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

DziałanieLeczy najbardziej uciążliwe i dokuczliwe objawy infekcji intymnej: ból, pieczenie, świąd i upławy.Zawiera klotrymazol –

substancję czynną, która ma szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego (niszczy grzyby oraz hamuje ich wzrost). **Sposób użycia** 1 tabletkę dopochwową = 1 aplikacja **Ważne** Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Skład** 1 tabletkę dopochwową zawiera 500 mg klotrymazolu

Galeria

PIROLAM[®] INTIMA[®] Vag LEK

pełna kuracja =
1 tabletkę dopochwową =
1 opakowanie



Clotrimazol
500 mg
1 aplikacja

• skutecznie niszczy grzyby drożdżowe i bakterie
• przeciwdziała nawrotom infekcji
• jest łatwy w użyciu i nie powoduje dyskomfortu
• szybko • ból (pieczenie) • swędzenie

PIROLAM[®] INTIMA[®] Vag LEK

Leczy i usuwa objawy grzybiczej
infekcji intymnej



pieczenie ból swędzenie upławy

PIROLAM[®] INTIMA[®] Vag LEK

- Maksymalna dawka klotrymazolu*
- Pełna kuracja = 1 tabletkę dopochwową
- Dostępny bez recepty
- Można stosować powyżej 16. roku życia (powyżej 12. roku życia pod nadzorem lekarza)**

* w tabletkę dopochwową
** Wskazanie charakterystyki produktu leczniczego Pirozam INTIMA Vag.

**INFEKCI INTYMNEJ
POWIEDZ "NIE"**



PIROLAM[®] INTIMA[®] Vag 1 APLIKACJA

Clotrimazol
500 mg
1 tabletkę dopochwową

Pirozam Intima Vag służy do leczenia infekcji i zaburzeń
związanych z nadmierną proliferacją
drożdżaków w obszarze intymnym.
Leczy objawy pieczenia, swędzenia, w tym:
• swędzenie • ból (pieczenie) • upławy