

POLOCARD 75 mg 120 tabletek dojelitowych Zentiva

Cena: 25,65 PLN



Opis słownikowy

Dawka	75 mg
Opakowanie	120 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	ZENTIVA K.S.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

WskazaniaLek Polocard 75 mg zawiera substancję czynną kwas acetylosalicylowy, który podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.**Działanie**Polocard to lek polecany do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.Polocard dostępny bez recepty pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu.Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.**Sposób użycia**Lek Polocard zawsze należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Zalecana dawka leku Polocard to: 1 - 2 tabletki (75 mg) na dobę.W świeżym zawałe serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to: od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.**Ważne**Działania niepożądane:Polocard może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one wystąpią.Zaburzenia żołądka i jelit.Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych.Zawroty głowy i szumy uszne, zaburzenia słuchu.Zaburzeni nerek i dróg moczowych.Niewydolność serca.Nadciśnienie tętnicze.Zaburzenia krwi i układu chłonnego.Zaburzenia układu immunologicznego.Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek.Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.**Skład**Kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). 1 tabletki dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.