

POLOCARD 75 mg 120 tabletek zakrzepcy



Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,075 g
Opakowanie	120 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	PFIZER
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wskazania Wskazania do stosowania: profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca; profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. **Działanie** Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów. **Sposób użycia** Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 - 2 tabletki 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę. **Ważne** Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba), ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. **Skład** 1 tabletki zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek, talk, sodu laurylosiarczan, lak z czerwieńią koszenilową E-124, krzemionka koloidalna, sodu wodorowęglan.