


## POLOPIRYNA GARDŁO 16 pastylek twardych

Cena: 20,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	8,75 mg
Opakowanie	16 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Flurbiprofenum

### Opis produktu

#### Opis

Na silny ból gardła i stan zapalny

Ból gardła jest spowodowany miejscowym stanem zapalnym

Polopiryna GARDŁO nie tylko zwalcza nawet silny ból gardła, ale również niweluje jego przyczynę stan zapalny

SZYBKIE DZIAŁANIE!

Zaczyna działać już po 2 minutach!

Przebadana klinicznie w bólu gardła substancja czynna Flurbiprofen\*

4,9/5

Średnia ocena użytkowników na ceneo.pl

Zobacz inne produkty

NA GARDŁO

**Polopiryna Gardło LEK**

PRZEZIĘBIENIE

**Polopiryna MAX LEK**

NA GARDŁO

**Polopiryna Gardło spray LEK**

PRZEZIĘBIENIE

**Polopiryna S LEK**

PRZEZIĘBIENIE

**Polopiryna C LEK**

PRZEZIĘBIENIE

**Polopiryna Complex LEK**

\*Badania kliniczne zgodne ze standardem GCP **Dotyczy leków Polopiryna S®, Polopiryna C®, Polopiryna Max®, Polopiryna Complex®, Polopiryna Gardło® Polopiryna Gardło. Skład i postać:** Każda pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Izomalt: 2034 mg/pastylkę; Maltitol: 427,5 mg/pastylkę; Czerwień koszenilowa (E 124): 0,013 mg/pastylkę; Żółcień pomarańczowa (E 110): 0,080 mg/pastylkę. Pastylka twarda. Okrągła, pomarańczowa pastylka twarda, o średnicy 19±1 mm, o smaku pomarańczowym. **Wskazania:** Produkt leczniczy Polopiryna Gardło jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawowym bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.02.23. **Polopiryna Gardło Spray. Skład i postać:** Jedna dawka (3 rozpylenia) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Jedno rozpylenie zawiera 2,92 mg flurbiprofenu. 1 ml aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu zawiera 17,16 mg flurbiprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: zawiera cyklodekstryny: betadeks: 18,50 mg/ml i 9,58/na dawkę; hydroksypropylobetadeks: 0,65 mg/ml i 0,33 mg/dawkę. Aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór przezroczysty, bezbarwny roztwór o smaku wiśniowym i pH w zakresie 7,3 7,8. **Wskazania:** Polopiryna Gardło Spray jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawowym ostrego bólu gardła u dorosłych. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2020.04.14. **Polopiryna Complex. Skład i postać:** Każda saszетка zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu co odpowiada 8,21 mg fenylefryny, 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, siarczyny (z aromatu pomarańczowego). Każda saszетка zawiera 2182 mg sacharozy. **Wskazania:** Kompleksowe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno stawowe, bóle głowy (m.in. spowodowane zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczenia jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie z oczu. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.04.26. **Polopiryna S. Skład i postać:** Każda tabletką zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego. Białe, obustronnie płaskie tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie. **Wskazania:** Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). Zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2019.08.16. **Polopiryna C. Skład i postać:** Każda tabletką zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sól. Każda tabletką zawiera 356 mg sodu. Tabletką musująca. Białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki, wrzucone do wody rozpuszczają się silnie musując. **Wskazania:** Bóle o słabym lub średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe i stawowe oraz inne. Gorączka w przebiegu

przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2020.06.15. **Polopiryna Max. Skład i postać:** Każda tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszełinowa, lak (E124). Tabletkę dojelitowe. Tabletkę barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2020.04.28.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY** Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83 200 Starogard Gdański

EML/2023/816

**Opis POLOPIRYNA GARDŁO 16 pastylek twardych** Polopiryna Gardło pastylki to lek zawierający w swoim składzie flurbiprofen o działaniu przeciwzapalnym. Odpowiedni do stosowania podczas bólu gardła. Można również stosować ten lek podczas trudności z przełykaniem oraz w przypadku występowania podrażnień. Działa znieczulająco i zmniejsza obrzęk. Czy wiesz, że? Ból gardła jest jednym z pierwszych symptomów przeziębienia lub grypy. Podczas jego występowania we wczesnym stadium możemy wypróbować również domowe sposoby takie jak płukanki z ziół o działaniu przeciwbakteryjnym. **Sposób użycia** Zalecana dawka to: Dorosli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 pastylka twarda co 3 do 6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek w ciągu 24 godzin. **Sposób podawania** Do stosowania w jamie ustnej. Pastylkę należy powoli rozpuszczać w ustach, nie połykać i nie żuć pastylki. Podczas rozpuszczania należy zawsze przemieszczać pastylkę w jamie ustnej. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Polopiryna Gardło jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowała kiedykolwiek w przeszłości astma, niespodziewane odgłosy podczas oddychania lub trudności w oddychaniu, wydzielina z nosa, obrzęk twarzy lub wysypka skórna ze świądem (pokrzywka), jeśli u pacjenta występuje lub występował wrzód w żołądka lub jelitach (dwa lub więcej epizodów wrzodów żołądka lub dwunastnicy), jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, ciężkie zapalenie jelita grubego lub choroby krwi związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży (III trymestr ciąży), jeśli u pacjenta występuje lub występowała ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. **Skład** Co zawiera lek Polopiryna Gardło Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), maltitol (E 965), czerwień koszełinowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), acesulfam potasowy (E 950), makrogol 300 (E 1521), aromat pomarańczowy (limonen (50,0%-100%), dekanal (0,0%-10%) cytral, cytronelol (0,1%-1,0%)), lewomentol. **Producent** POLPHARMA