OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

POLOPIRYNA GARDŁO 16 pastylek twardych



Cena: 19,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka	8,75 mg
Opakowanie	16 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Flurbiprofenum

Opis produktu

Opis

Na silny ból gardła i stan zapalny

Ból gardła jest spowodowany miejscowym stanem zapalnym

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Polopiryna GARDŁO nie tylko zwalcza nawet silny ból gardła, ale również niweluje jego przyczynę stan zapalny

SZYBKIE DZIAŁANIE!

Zaczyna działać już po 2 minutach!

Przebadana klinicznie w bólu gardła substancja czynna Flurbiprofen*

4,9/5

Średnia ocena użytkowników na ceneo.pl

Zobacz inne produkty

NA GARDŁO

Polopiryna Gardło LEK

PRZEZIĘBIENIE

Polopiryna MAX LEK

NA GARDŁO

Polopiryna Gardło spray LEK

PRZEZIĘBIENIE

Polopiryna S LEK

PRZEZIĘBIENIE

Polopiryna C LEK

PRZEZIĘBIENIE

Polopiryna Complex LEK

*Badania kliniczne zgodne ze standardem GCP **Dotyczy leków Polopiryna S®, Polopiryna C®, Polopiryna Max®, Polopiryna Complex®, Polopiryna Gardło® Polopiryna Gardło. Skład i postać**: Każda pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Izomalt: 2034 mg/pastylkę; Maltitol: 427,5 mg/pastylkę; Czerwień koszenilowa (E 124): 0,013 mg/pastylkę; Żółcień pomarańczowa (E 110): 0,080 mg/pastylkę. Pastylka twarda. Okrągła, pomarańczowa pastylka twarda, o średnicy 19±1 mm, o smaku pomarańczowym. **Wskazania**: Produkt leczniczy Polopiryna Gardło jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawowym bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny**: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.02.23. **Polopiryna Gardło Spray. Skład i postać**: Jedna dawka (3 rozpylenia) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Jedno rozpylenie zawiera 2,92 mg flurbiprofenu. 1 ml aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu zawiera 17,16 mg flurbiprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: zawiera cyklodekstryny: betadeks: 18,50 mg/ml i 9,58/na dawkę; hydroksypropylobetadeks: 0,65 mg/ml i 0,33 mg/dawkę. Aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór przezroczysty, bezbarwny roztwór o smaku wiśniowym i pH w zakresie 7,3 7,8. **Wskazania**: Polopiryna Gardło Spray jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawowym ostrego bólu gardła u dorosłych. **Podmiot odpowiedzialny**: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2020.04.14. **Polopiryna Complex. Skład i postać**: Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu co odpowiada 8,21 mg fenylefryny, 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, siarczyny (z aromatu pomarańczowego). Każda saszetka zawiera 2182 mg sacharozy. **Wskazania**: Kompleksowe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno stawowe, bóle głowy (m.in. spowodowane zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczenia jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie z oczu. **Podmiot odpowiedzialny**: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.04.26. **Polopiryna S. Skład i postać**: Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego. Białe, obustronnie płaskie tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie. **Wskazania**: Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). Zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego. **Podmiot odpowiedzialny**: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2019.08.16. **Polopiryna C. Skład i postać**: Każda tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód. Każda tabletka zawiera 356 mg sodu. Tabletka musująca. Białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki, wrzucone do wody rozpuszczają się silnie musując. **Wskazania**: Bóle o słabym lub średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe i stawowe oraz inne. Gorączka w przebiegu

przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób. **Podmiot odpowiedzialny**: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2020.06.15. **Polopiryna Max. Skład i postać**: Każda tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszelinowa, lak (E124). Tabletki dojelitowe. Tabletki barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania**: Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). **Podmiot odpowiedzialny**: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2020.04.28.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA" S.A. ul. Pelplińska 19, 83 200 Starogard Gdański

EML/2023/816

OpisPOLOPIRYNA GARDŁO 16 pastylek twardych Polopiryna Gardło pastylki to lek zawierający w swoim składzie flurbiprofen o działaniu przeciwzapalnym. Odpowiedni do stosowania podczas bólu gardła. Można również stosować ten lek podczas trudności z przełykaniem oraz w przypadku występowania podrażnień. Działa znieczulająco i zmniejsza obrzęk.Czy wiesz, że?Ból gardła jest jednym z pierwszych symptomów przeziębienia lub grypy. Podczas jego występowania we wczesnym stadium możemy wypróbować również domowe sposoby takie jak płukanki z ziół o działaniu przeciwbakteryjnym.**Sposób użycia**Zalecana dawka to:Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 pastylka twarda co 3 do 6 godzin, w razie potrzeby.Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek w ciągu 24 godzin.Sposób podawaniaDo stosowania w jamie ustnej.Pastylkę należy powoli rozpuszczać w ustach, nie połykać i nie żuć pastylki.Podczas rozpuszczania należy zawsze przemieszczać pastylkę w jamie ustnej.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Polopiryna Gardłojeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekujeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowała kiedykolwiek w przeszłości astma, niespodziewane odgłosy podczas oddychania lub trudności w oddychaniu, wydzielina z nosa, obrzęk twarzy lub wysypka skórna ze świądem (pokrzywka),jeśli u pacjenta występuje lub występował wrzód w żołądku lub jelitach (dwa lub więcej epizodów wrzodów żołądka lub dwunastnicy),jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, ciężkie zapalenie jelita grubego lub choroby krwi związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży (III trymestr ciąży),jeśli u pacjenta występuje lub występowała ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek.**Skład**Co zawiera lek Polopiryna GardłoSubstancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), maltitol (E 965), czerwień koszenilowa (E 124), żółcieńpomarańczowa (E 110), acesulfam potasowy (E 950), makrogol 300 (E 1521), aromat pomarańczowy(limonen (50,0%-100%), dekanal (0,0%-10%) cytral, cytronelol (0,1%-1,0%)), lewomentol.**Producent**POLPHARMA

Galeria

POLOPIRYNA
GARDŁO
ZWALCZA
SILNY BÓL
GARDŁA
POLOPIRYNA
GARDŁO
24
LEK

POLOPIRYNA
GARDŁO
ŚREDNIA OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
NA CENEO
4,9/5

ULGA
JUŻ PO 2
MINUTACH!*
POLOPIRYNA
GARDŁO
24

POLOPIRYNA
GARDŁO
NIE
ZAWIERA
CUKRU
POLOPIRYNA
GARDŁO
24

POLOPIRYNA
GARDŁO
ELIMINUJE BÓL
GARDŁA ORAZ
ZWALCZA JEGO
PRZYCZYNĘ -
STAN ZAPALNY
POLOPIRYNA
GARDŁO
24