

POLOPIRYNA GARDŁO Spray do stosowania w jamie ustnej 15 ml



Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	8,75 mg/daw.
Opakowanie	15 ml
Postać	aer.do stos.w j.ust., roztw.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Flurbiprofenum

Opis produktu

Opis POLOPIRYNA GARDŁO Spray do stosowania w jamie ustnej 15 ml Lek Polopiryna Gardło Spray jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak podrażnienie, ból gardła, trudności z przełykaniem i obrzęk u osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej. Substancją czynną jest flurbiprofen. Flurbiprofen należy do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają przez zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę. **Sposób użycia** Zalecana dawka Dorośli w wieku 18 lat i powyżej: Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) na tylną część gardła co 3-6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 godzin. Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Wyłącznie do stosowania w jamie ustnej. Rozpylić aerozol jedynie na tylną część gardła. Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek (15 rozpyleń aerozolu) w ciągu 24 godzin. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Polopiryna Gardło Spray Jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub kwasu acetylosalicylowego, np. astma, świszczący oddech, swędzenie, nieżyt nosa, wysypka skórna, obrzęk; jeśli pacjent ma lub miał dwa lub więcej epizodów wrzodów żołądka, krwawienia lub owrzodzenia jelit; jeśli pacjent kiedykolwiek miał ciężkie zapalenie okrężnicy (zapalenie jelita grubego); jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia krzepnięcia lub problemy z krwawieniem po przyjęciu NLPZ; jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży; jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, nerek lub wątroby. **Skład** Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna dawka (3 rozpylenia) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Jedno rozpylenie zawiera 2,92 mg flurbiprofenu. 1 ml roztworu zawiera 17,16 mg flurbiprofenu. Pozostałe składniki to: sacharyna sodowa (E 954), kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, disodu fosforan dwunastowodny, betadeks (E 459), hydroksypropylobetadeks, aromat wiśniowy, woda oczyszczona. Skład aromatu wiśniowego: składniki nadające smak i zapach, etanol, trioctan glicerolu, glikol propylenowy (E 1520), kwas askorbowy, DL-alfa-tokoferol, woda. **Producent** Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 1983-200 Starogard Gdański