

## POSTERISAN 10 czopków



Cena: 33,30 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 czop.
Postać	czop.
Producent	DR KADE
Rodzaj rejestracji	Lek

### Opis produktu

#### Opis

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzania świądu i pieczenia. Czopki Posterisan stosuje się w świądzie, sączeniu i pieczeniu okolicy odbytu spowodowanych guzkami krwawniczymi.

#### Przeciwwskazania

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku Posterisan.

#### Zachować ostrożność

Jeśli wystąpią zakażenia grzybicze wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo leków przeciwgrzybiczych.

#### Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania czopków Posterisan w czasie ciąży i karmienia piersią.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Posterisan nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

## Stosowanie

Lek Posterisan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj należy stosować czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy. Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że jeśli jest to konieczne, lek Posterisan może być podawany przez dłuższy okres czasu, zwłaszcza w celu uniknięcia nawrotów. Nawet po ustąpieniu ostrego świądu, śączenia i pieczenia, podawanie leku Posterisan powinno być kontynuowane. Zaleca się stosowanie jednocześnie maści i czopków.

Uwaga! W celu wyjęcia czopka rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuż opakowania.

## Skład

1 czopek Posterisan zawiera:

Substancja czynna: 387,1 mg wodnej zawiesiny martwych bakterii # przemiany materii z 660 mln bakterii *Escherichia coli* zabitych i konserwowanych maksymalnie 6,6 mg rozcieńczonego fenolu – co odpowiada maksymalnie 6 mg czystego fenolu).

Inne składniki leku to: tłuszcz stały, hydroksystearynian makroglicerolu.