

PROCTO-GLYVENOL krem doodbytniczy 30 g na hemoroidy

Cena: 26,75 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,05g+0,02g
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Producent	NOVARTIS
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Wskazania Procto-Glyvenol® to krem doodbytniczy na hemoroidy bez recepty. Przeznaczony jest do miejscowego leczenia wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidów. Krem Procto-Glyvenol® zawiera dwie substancje czynne: tribenozyd i lidokainy chlorowodorek. Tribenozyd działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo. Zapobiega również uszkodzeniu śródbłonna naczyń krwionośnych. Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą. Łagodzi przykre dolegliwości związane z hemoroidami, takie jak ból, świąd i pieczenie. **Działanie** Skuteczne leczenie hemoroidów. 1 Szybka ulga - działa już po 10 minutach! 1 Potrójny mechanizm działania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwświądowy. Może być stosowany w ciąży (od 4-ego miesiąca) i podczas karmienia piersią. 21. Lorenc Z., Gökce Ö.; Tribenoside and lidocaine in the local treatment of hemorrhoids: an overview of clinical evidence. European Review for Medical and Pharmacological Sciences; 2016: 20: 2742- 2751. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol (50mg+20mg)/g. krem doodbytniczy, data zatwierdzenia 10/2016. **Sposób użycia** Podanie doodbytnicze. Krem doodbytniczy na hemoroidy Procto-Glyvenol® należy stosować rano i wieczorem, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę. W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów, krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu, a po aplikacji umieścić na swoim miejscu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku. Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku. Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie należy stosować leku doustnie. Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. **Ważne** Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku na hemoroidy Procto-Glyvenol®? przy nadwrażliwości na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej. **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Aby uzupełnić leczenie hemoroidów kremem bez recepty Procto-Glyvenol®, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie racjonalnej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca. Przed rozpoczęciem stosowania leku ProctoGlyvenol® w postaci kremu doodbytniczego u osób z zaburzeniami czynności wątroby należy omówić to z lekarzem. Lek ProctoGlyvenol® w postaci kremu doodbytniczego należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby. Kremu doodbytniczego na hemoroidy Procto-Glyvenol® nie należy stosować u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Nie wolno stosować produktu leczniczego doustnie. Należy unikać kontaktu z oczami. Procto-Glyvenol® w ciąży i w czasie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku na hemoroidy Procto-Glyvenol® nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży. Krem doodbytniczy Procto-Glyvenol® może być stosowany od 4-ego miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Procto-Glyvenol® nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Procto-Glyvenol® zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan. Alkohol cetylowy może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry). Metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Opakowanie leku zawiera gumę lateksową. Może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko występujące działania niepożądane (więcej niż 1 osoba na każde 10 000 leczonych, mniej niż 1 osoba na każde 1000 leczonych): Pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000): Reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy. Przechowywanie / Termin ważności: Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. **Skład** Substancjami czynnymi kremu doodbytniczego na hemoroidy Procto-Glyvenol® są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum). 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodoru. Substancjami pomocniczymi są: sorbitanu stearynian (Arlacel 60), makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekryształujący, kwas stearynowy i woda oczyszczona. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia

Galeria

**SZYBKO I SKUTECZNIE
 UWALNIA OD HEMOROIDÓW!**

↑ krem doodbytniczy



Procto-Glyvenol

↓ DZIAŁA JUŻ PO 10 MINUTACH

Procto-Glyvenol
 Tribenosidum + Lidocainum

NR 1

**W POLSCE
 W LECZENIU CHOROBY
 HEMOROIDALNEJ!**

Lek bez recepty w postaci kremu doodbytniczego do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów

Procto-Glyvenol
 Tribenosidum + Lidocainum

**ZNIECZULA I PRZYNOSI
 SZYBKĄ ULGĘ,**
 tagodzi:

- ♦ świąd
- ♦ pieczenie
- ♦ ból



Procto-Glyvenol
 Tribenosidum + Lidocainum

TRIBENOZYD + LIDOKAINA
 połączenie dwóch aktywnych składników

- ♦ redukuje stan zapalny
- ♦ zmniejsza obrzęk
- ♦ zapobiega krwawieniu
- ♦ tagodzi ból, świąd i pieczenie



Procto-Glyvenol
 Tribenosidum + Lidocainum

LEK NA HEMOROIDY!
 który może być stosowany

od 4-ego miesiąca ciąży²

podczas karmienia piersią.²



Procto-Glyvenol
 Tribenosidum + Lidocainum

- ♦ działa miejscowo na dokuczliwe objawy i leczy hemoroidy
- ♦ nie brudzi bielizny
- ♦ tania i higieniczna aplikacja



Procto-Glyvenol

POZNAJ LINIĘ PRODUKTÓW NA HEMOROIDY



♦ nawilżane chusteczki dla osób z hemoroidami

Procto-Glyvenol

POZNAJ LINIĘ PRODUKTÓW NA HEMOROIDY

↑ krem doodbytniczy

↓ czopki



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.