


# RAPHACHOLIN C 30 tabletek, niestrawność, trawienie, wątroba



Cena: 14,90 PLN

## Opis słownikowy

Producent HERBAPOL WROCLAW

Rodzaj rejestracji Lek

## Opis produktu

### Opis

Raphacholin C jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Raphacholin C zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym # , wyciąg gęsty z zieleń karczocha, kwas dehydrocholowy oraz olejek miętowy. Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo # wątrobę, pobudza wydzielanie żółci # wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmacnia ruchy perystaltyczne jelit.

## Wskazania

Raphacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby # brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

## Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, ciężkich chorobach wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.

## Stosowanie leku Raphacholin C u dzieci

Po konsultacji z lekarzem można stosować u dzieci powyżej 10 roku życia 1 tabletkę drażowaną 3 razy dziennie po posiłku.

## Ciąża

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w tym okresie.

## Karmienie piersią

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią. Niektóre składniki preparatu przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w tym okresie.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Raphacholin C® na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

### Dawkowanie

Lek stosować doustnie. Dorośli - w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2 tabletek 30 min. po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem. Po konsultacji z lekarzem, u dzieci powyżej 10 lat 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Raphacholin C niż zalecana

W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki #  
drażowanych#  
oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudności.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, Raphacholin C może powodować działania niepożądane. Sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na składniki leku. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

## Skład

1 tabletkę drażowaną zawiera

Substancje czynne: Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis

#	#	- 150 mg#	Cynarae herbae
extractum spissum #	- 47 mg#		Acidum dehydrocholicum #
dehydrocholowy) - 40 mg	Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) - 15 mg		

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan, węgiel leczniczy