

RECENUM JUNIOR 30 mg 10 saszetek

Cena: 19,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	30 mg
Opakowanie	10 sasz.
Postać	gran.do sporz.zaw.doust.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Racecadotrilum

Opis produktu

Opis

Hamuje utratę wody i elektrolitów w jelitach, przez co zmniejsza ryzyko odwodnienia

Skraca czas trwania biegunki o prawie 2 dni²

Zmniejsza objętość stolca, nie powoduje wzdęć ani zaparć¹

Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami Działa już od pierwszej dawki³ Nie powoduje wzdęć ani zaparć¹

1. W badaniach częstość zaparć była porównywalna z placebo; 2. Gordon M., Akobeng A.: Racecadotril for acute diarrhoea in children: systematic review and meta-analyses. Arch Dis Child 2016, 101(3): 234–240; 3. Najwyższa inhibicja enkefalinazy w osoczu osiągnięta jest po około 2 godzinach i odpowiada zahamowaniu 90% po dawce 1,5 mg/kg. Czas trwania inhibicji enkefalinazy wynosi około 8 godzin.

Uzupełniające leczenie objawowe ostrej biegunki u dzieci powyżej 6. roku życia, z jednoczesnym stosowaniem nawodnienia doustnego i zwykłego postępowania podtrzymującego, jeśli samo takie leczenie nie pozwala na opanowanie objawów klinicznych, a leczenie przyczynowe nie jest możliwe.

Recenum Junior występuje w postaci granulatu przeznaczonego do połykania.

Wygodna forma saszetki do podania, w wodzie, butelce lub jedzeniu

Nie zawiera konserwantów

Nie zawiera aromatów

Nie zawiera dodatku substancji smakowych

Każda saszetka zawiera 30 mg racekadotrylu (Racecadotrilum).

Pozostałe składniki to: sacharoza; krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K30).

Dawka zalecana uzależniona jest od masy ciała dziecka: 1,5 mg/kg na dawkę (co odpowiada 1-2 saszetkom), 3 razy na dobę w regularnych odstępach.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Wskazania Recenum Junior jest lekiem stosowanym w doraźnym leczeniu ostrej biegunki u dzieci powyżej 6. roku życia, w połączeniu z dużą ilością płynów i dietą wspomagającą, gdy nie są one same wystarczające do kontroli biegunek i gdy biegunka nie może być leczona przyczynowo. **Działanie** Recenum Junior zawiera racekadotryl, który zmniejsza wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelita i zmniejsza ilość stolców biegunkowych, przez co zmniejsza utratę wody i zmniejsza konieczność nawodnienia. Racekadotryl stosowany jest w biegunce o różnej etiologii - wykazuje skuteczność zarówno w przypadku biegunek rotawirusowych, bakteryjnych i o innej etiologii. Recenum Junior wywołuje szybkie działanie przeciwbiegunkowe bez zmiany ciągłości pasażu przez jelita. Nie powoduje więc wzdęć, ani zaparć. Po podaniu doustnym wykazuje działanie wyłącznie obwodowe, bez wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Recenum Junior nie zawiera sztucznych barwników i aromatów. Ma wygodną postać granulek, które można dodać do jedzenia lub wody. **Sposób użycia** Lek Recenum Junior należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Recenum Junior występuje w postaci granulatu przeznaczonego do połykania. Granulat należy dodać do jedzenia lub zmieszać z wodą w szklance, dobrze wymieszać i natychmiast podać dziecku. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy białą zawiesinę. Dawka zalecana uzależniona jest od masy ciała dziecka: 1,5 mg/kg na dawkę (co odpowiada 1-2 saszetkom), 3 razy na dobę w regularnych odstępach. U dzieci o masie ciała od 13 do 27 kg: jedna saszетка na dawkę. Dawkę należy stosować 3 razy na dobę, czyli dawka dobową to 3 saszetki (3 razy dziennie po 1 saszetce). U dzieci o masie ciała od 27 do 40 kg: dwie saszetki na dawkę. Dawkę należy stosować 3 razy na dobę, czyli dawka dobową to 6 saszetek (3 razy dziennie po 2 saszetki). U dzieci o masie ciała poniżej 13 kg lekarz może zalecić stosowanie leku Recenum Baby 10 mg, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, w saszetce. Leczenie powinno być kontynuowane do czasu oddania dwóch normalnych stolców i nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki, lek ten powinien być stosowany równocześnie odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów). **Ważne** Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. **Skład** Substancją czynną leku jest racekadotryl (Racecadotrilum). Każda saszетка zawiera 30 mg racekadotrylu (Racecadotrilum). Pozostałe składniki to: sacharoza; krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K30)

Galeria

LEK OTC



LEK NA BIEGUNKĘ

Recenum



- Hamuje utratę wody i elektrolitów w jelitach, przeto co zmniejsza ryzyko odwodnienia
- Zmniejsza objętość stolca, nie powoduje wzdęć ani zaparć!
- Skraca czas trwania biegunki o prawie 2 dni!
- Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami. Działa już od pierwszej dawki! Nie powoduje wzdęć ani zaparć!

1. W składzie: czynnik czynny: butyloparacetamol 2. Ciężar: 10. Aktywny składnik: 100 mg. 3. W składzie: 100 mg. 4. W składzie: 100 mg. 5. W składzie: 100 mg. 6. W składzie: 100 mg. 7. W składzie: 100 mg. 8. W składzie: 100 mg. 9. W składzie: 100 mg. 10. W składzie: 100 mg. 11. W składzie: 100 mg. 12. W składzie: 100 mg. 13. W składzie: 100 mg. 14. W składzie: 100 mg. 15. W składzie: 100 mg. 16. W składzie: 100 mg. 17. W składzie: 100 mg. 18. W składzie: 100 mg. 19. W składzie: 100 mg. 20. W składzie: 100 mg. 21. W składzie: 100 mg. 22. W składzie: 100 mg. 23. W składzie: 100 mg. 24. W składzie: 100 mg. 25. W składzie: 100 mg. 26. W składzie: 100 mg. 27. W składzie: 100 mg. 28. W składzie: 100 mg. 29. W składzie: 100 mg. 30. W składzie: 100 mg. 31. W składzie: 100 mg. 32. W składzie: 100 mg. 33. W składzie: 100 mg. 34. W składzie: 100 mg. 35. W składzie: 100 mg. 36. W składzie: 100 mg. 37. W składzie: 100 mg. 38. W składzie: 100 mg. 39. W składzie: 100 mg. 40. W składzie: 100 mg. 41. W składzie: 100 mg. 42. W składzie: 100 mg. 43. W składzie: 100 mg. 44. W składzie: 100 mg. 45. W składzie: 100 mg. 46. W składzie: 100 mg. 47. W składzie: 100 mg. 48. W składzie: 100 mg. 49. W składzie: 100 mg. 50. W składzie: 100 mg. 51. W składzie: 100 mg. 52. W składzie: 100 mg. 53. W składzie: 100 mg. 54. W składzie: 100 mg. 55. W składzie: 100 mg. 56. W składzie: 100 mg. 57. W składzie: 100 mg. 58. W składzie: 100 mg. 59. W składzie: 100 mg. 60. W składzie: 100 mg. 61. W składzie: 100 mg. 62. W składzie: 100 mg. 63. W składzie: 100 mg. 64. W składzie: 100 mg. 65. W składzie: 100 mg. 66. W składzie: 100 mg. 67. W składzie: 100 mg. 68. W składzie: 100 mg. 69. W składzie: 100 mg. 70. W składzie: 100 mg. 71. W składzie: 100 mg. 72. W składzie: 100 mg. 73. W składzie: 100 mg. 74. W składzie: 100 mg. 75. W składzie: 100 mg. 76. W składzie: 100 mg. 77. W składzie: 100 mg. 78. W składzie: 100 mg. 79. W składzie: 100 mg. 80. W składzie: 100 mg. 81. W składzie: 100 mg. 82. W składzie: 100 mg. 83. W składzie: 100 mg. 84. W składzie: 100 mg. 85. W składzie: 100 mg. 86. W składzie: 100 mg. 87. W składzie: 100 mg. 88. W składzie: 100 mg. 89. W składzie: 100 mg. 90. W składzie: 100 mg. 91. W składzie: 100 mg. 92. W składzie: 100 mg. 93. W składzie: 100 mg. 94. W składzie: 100 mg. 95. W składzie: 100 mg. 96. W składzie: 100 mg. 97. W składzie: 100 mg. 98. W składzie: 100 mg. 99. W składzie: 100 mg. 100. W składzie: 100 mg.

USP Zarwio

Recenum

remedium na ostrą biegunkę



Recenum Junior 6+ r.z.

USP Zarwio

Recenum



Recenum Junior 6+ r.z.

LEK OTC

Miła forma dawkowania
 Dawkowanie: 13-27 kg powyżej 27 kg

1 saszetka x 5 nie dożył 2 saszetki x 5 nie dożył

USP Zarwio

Recenum



Wygodna forma saszetki do podania w wodzie, butelce lub jedzeniu

- Nie zawiera konserwantów
- Nie zawiera aromatów
- Nie zawiera dodatku substancji smakowych

USP Zarwio