

## REMOLEXAM 7,5 mg 20 tabletek



Cena: 8,65 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	7,5 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.
Producent	VITAL PHARMA GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Meloxicamum

### Opis produktu

**Wskazania**Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, bóle mięśniowe, kostne i stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa.**Działanie**Przeciwbólowe, przeciwzapalne.**Sposób użycia**Dorośli i dzieci powyżej 16 lat 1 tabletkę na dobę.**Ważne**Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), to znaczy, jeśli u pacjenta kiedykolwiek pojawiły się jakiegokolwiek z poniższych objawów po przyjęciu tych leków: świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma), niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa), wysypka skórna lub pokrzywka, nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, taki jak obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy); jeśli u pacjenta po wcześniejszej terapii NLPZ wystąpiły krwawienia z żołądka lub jelit, lub perforacja żołądka, lub jelit; jeśli pacjent ma obecnie (lub miał dwa, lub więcej epizodów) chorobę wrzodową (wrzód żołądka lub jelit) lub krwawienie z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby; jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek niewymagającą dializy; jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu; jeśli u pacjenta wystąpiły jakiegokolwiek inne krwawienia; jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca; u pacjentek w ostatnich trzech miesiącach ciąży; u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.**Skład**1 tabletkę zawiera: 7,5mg meloxicamu, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-17, sodu cytrynian, krospowidon (typ B), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.