

RIVANOL 0,1% 500 g



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---|
| Dawka | 1 mg/g |
| Opakowanie | 500 g |
| Postać | płyn do stos.na skórę |
| Producent | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SP. Z O.O., PATEREK |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Ethacridini lactas |

Opis produktu

WskazaniaRIVANOL 500 gOdkazanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).**Działanie**Etakrydyny mleczan wchłania się w niewielkich ilościach do organizmu z powierzchni ran i z zapalnie zmienionej skóry oraz z błon śluzowych. Następnie jest wydalany w stanie niezmienionym przez nerki i wątrobę. Etakrydyny mleczan działa miejscowo.**Sposób użycia**Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.Rivanol 0,1% stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.DzieciBrak danych dotyczących stosowania u dzieci.**Ważne**Nie należy stosować produktu leczniczego:w nadwrażliwości na etakrydyny mleczan lub barwniki akrydynowe,doustnie,do oczu.Nie stosować długotrwanie, gdyż produkt leczniczy może spowodować odczyny alergiczne, szczególnie u osób nadwrażliwych.Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry. Unikać kontaktu z odzieżą.Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcjiNależy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo. Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować produktu leczniczego ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu.Ciąża i laktacjaBrak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchuRivanol 0,1% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działanie niepożądaneMogą wystąpić odczyny alergiczne.

PrzedawkowanieNie są dostępne dane dotyczące przedawkowania produktu leczniczego w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.W przypadku omyłkowego wypicia produktu leczniczego, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.**Skład**1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu (Ethacridini lactas).Substancją czynną produktu leczniczego jest etakrydyny mleczan, który należy do grupy barwników akrydynowych. Etakrydyny mleczan działa przeciwbakteryjnie na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie Gram-dodatnie.