

ROWACHOL 50 kapsułek DELFARMA



Cena: 22,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

Opis produktu

Wskazania Leczenie łagodnych dolegliwości spowodowanych kamicą żółciową. Profilaktyka kamicy żółciowej. Stany skurczowe dróg żółciowych i dyskineza dróg żółciowych. **Działanie** ROWACHOL® jest lekiem, który powoduje ustępowanie łagodnych dolegliwości spowodowanych kamicą żółciową. Działa żółciopędnie zmniejszając zastój żółci a także rozkurczająco zmniejszając dolegliwości bólowe w stanach skurczowych dróg żółciowych. Na podstawie danych doświadczalnych przyjmuje się, że systematyczne przyjmowanie preparatu ułatwia proces rozpadu istniejących kamieni cholesterolowych oraz zapobiega powstawaniu nowych. **Sposób użycia** Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3–4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami. Dzieci od 6 do 14 lat: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 1–2 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami. **Sposób użycia:** Doustnie. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. W przypadku wrażenia, że działanie leku Rowachol® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej dawki leku Rowachol® niż zalecana: Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Rowachol®. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Leczenie zatrucia:** Jeśli lek został przyjęty niedawno, żołądek należy opróżnić stosując płukanie żołądka. Chory powinien być pod stałą obserwacją. W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe. Zaleca się monitorowanie czynności serca, wydolności oddechowej oraz wykonanie badań laboratoryjnych. W przypadku pominięcia dawki leku: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. **Ważne** Nie należy stosować leku Rowachol® w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowachol®, ciąży, okresu karmienia piersią, ostrych stanów zapalnych dróg żółciowych, uszkodzeń wątroby. **Skład** Jedna kapsułka zawiera: α-pinen 13,6 mg β-pinen 3,4 mg Camphen 5,0 mg Cineol 2,0 mg Menthon 6,0 mg Menthol 32,0 mg Borneol 5,0 mg Substancje pomocnicze: Oliwa z oliwek 33,0 mg Powłóczka kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, hydroksybenzoesan etylu (sól sodowa), hydroksybenzoesan propylu (sól sodowa), wodny roztwór miedziowego kompleksu chlorofilu (E141).