

## SACHOL Kids żel 15 ml

Cena: 19,29 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 ml
Postać	-
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis

Jak działa SACHOL® KIDS Co zawiera SACHOL® KIDS Dlaczego warto wybrać SACHOL® KIDS Szczegóły produktu

Jak działa SACHOL® KIDS?

Dzięki specjalnemu składowi SACHOL® KIDS z aplikatorem wykazuje **skuteczne działanie barierowe**, umożliwiając **szybkie zmniejszenie bólu w miejscu afty** i ułatwiając gojenie owrzodzenia<sup>1</sup>.

Co zawiera SACHOL® KIDS?

POTRÓJNA SIŁA DZIAŁANIA

na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej\*

EKSTRAKTZ RÓŻY DAMASCEŃSKIEJ<sup>2,3</sup>

wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe

SÓL SODOWAKWASU HIALURONOWEGO<sup>4,5,6</sup>

tworzy okluzyjną warstwę ochronną, nawilża i hamuje proces zapalny

PANTENOL<sup>7</sup>

wspomaga regenerację komórek i gojenie ran

Dlaczego warto wybrać SACHOL® KIDS?

SACHOL® KIDS<sup>1</sup>:

**Szybko łagodzi** dyskomfort i **ból** Ułatwia i **przyspiesza gojenie aft** Nie wywołuje pieczenia (nie zawiera alkoholu) Nie zawiera parabenów Nie zawiera cukru

Tuba z aplikatorem ułatwia precyzyjne i wygodne podanie preparatu.

Aromat czerwonych owoców jest przyjemny dla dzieci

Szczegóły produktu SACHOL® KIDS

Skład Postać farmaceutyczna Dawkowanie i sposób podawania Inne informacje Podmiot prowadzący reklamę

Woda, Ksylitol, Gliceryna, Wyciąg z płatków róży damasceńskiej, Guma ksantanowa, Polikarbofil (1,3%), Wodorotlenek sodu, Sól sodowa kwasu hialuronowego (0,24%), Pektyna, Sorbinian potasu (0,2%), Benzoesan sodu (0,2%), Stewia, Pantenol, Naturalne aromaty czerwonych owoców, Wyciąg z liści aloesu zwyczajnego (0,05%).

Żel

Nałożyć niewielką ilość żelu na zmieniony obszar, po posiłku, czystymi palcami lub za pomocą patyczka higienicznego. Stosować dwa lub trzy razy dziennie (lub w razie potrzeby częściej) przez tydzień lub do ustąpienia objawów.

Zamknąć opakowanie po każdym użyciu. Zaleca się powstrzymanie od jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po nałożeniu, aby ułatwić przyleganie produktu do błony śluzowej. Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia. Nie zaleca się stosowania tego produktu u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.

PRZECHOWYWANIE i KONSERWACJA:

Przechowywać poniżej 25°C. Termin ważności odnosi się do produktu nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego. Nie używać po terminie ważności podanym na opakowaniu. Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia. Pozostałości produktu lub produkt przeterminowany można usunąć do domowych odpadów.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Na podstawie piśmiennictwa naukowego nie stwierdzono żadnych znanych ani przewidywalnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tego produktu. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania produktu należy zasięgnąć porady lekarza. Każdy poważny incydent należy zgłosić do producenta i lokalnego organu kompetentnego, którzy udzielą dalszych wskazówek.

OSTRZEŻENIA:

Produkt jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej. Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości na jeden lub więcej

składników produktu. Jeśli pacjent aktualnie stosuje, niedawno stosował lub planuje stosować inne leki, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zaleca się stosowanie produktu przynajmniej 2 godziny po zażyciu leków lub suplementów. Jeśli objawy nie ulegną złagodzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem. Należy zamknąć opakowanie po każdym użyciu. Termin ważności dotyczy nienaruszonego opakowania produktu, który jest prawidłowo przechowywany. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone. Nie należy przyjmować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Produkt należy używać zgodnie z instrukcjami. Produkt należy zutilizować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot prowadzący reklamę: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o., Aleja Szucha 13/15, 00-580 Warszawa.

Producent: Farmaceutici Procemsa S.p.A. Via Mentana 10, 10042 Nichelino (TO), Włochy.

Sachol Kids to wyrób medyczny do stosowania na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej u dzieci w wieku powyżej 30 miesięcy.  
Referencje: \* u dzieci w wieku powyżej 30 miesięcy

Ulotka dołączona do preparatu - SACHOL® KIDS, żel dla dzieci. Nayebe N et al. A systematic review of the efficacy and safety of Rosa damascena Mill. with an overview on its phytopharmacological properties. Complement Ther Med. 2017 Oct;34:129-140. Gandhi S et al. Ayurvedic Preparations For The Management Of The Ras - A Review. Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences September 2020;7(9). Mustafa BN, Alzubaidee AF. Comparative Evaluation of The Efficacy of Topical Hyaluronic Acid (0,2%) and Topical Triamcinolone Acetonide (0,1%) in The Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis. Diyala Journal of Medicine. Vol.19.Issue 2,December 2020. Koray M et al. The Efficacy of Hyaluronic Acid Gel in Pain Control of Recurrent Aphthous Stomatitis. Int J Dentistry Oral Sci. 2016 3(6), 273-275. Systematic review: The efficacy of topical hyaluronic acid on oral ulcers. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. December 2017; 31(4 Suppl 2). Gorski J et al. Dexpanthenol in Wound Healing after Medical and Cosmetic Interventions (Postprocedure Wound Healing). Pharmaceuticals 2020, 13, 138.

SAC-PL-062023-05

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Właściwości**Sachol Kids:żel na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej,łagodzi dyskomfort i ból,ułatwia gojenie aft,nie zawiera alkoholu (nie wywołuje pieczenia),nie zawiera parabenów,bez cukru,dzięki specjalnemu składowi spray wykazuje skuteczne działanie barierowe, umożliwiając zmniejszenie bólu w miejscach afty i ułatwia gojenie owrzodzenia,zawiera aromat czerwonych owoców.**Sposób użycia**Nałożyć niewielką ilość żelu na zmieniony obszar, po posiłku, czystymi palcami lub za pomocą patyczka higienicznego. Stosować dwa lub trzy razy dziennie (lub w razie potrzeby częściej) przez tydzień lub do ustąpienia objawów. Zamknąć opakowanie po każdym użyciu. Zaleca się powstrzymanie od jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po nałożeniu, aby ułatwić przyleganie wyrobu do błony śluzowej. Wyrób należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia. Nie zaleca się stosowania tego wyrobu u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy. UWAGA! Przed użyciem należy dokładnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcje dotyczące stosowania podane w ulotce dla pacjenta.**Ważne**Przeciwwskazania i środki ostrożności:Jeśli pacjent aktualnie stosuje, niedawno stosował lub planuje stosować inne wyroby medyczne lub leki, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutąZaleca się stosowanie wyrobu przynajmniej 2 godziny po zażyciu leków lub suplementów.Jeśli objawy nie ulegną złagodzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza. • Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem. • Należy zamknąć opakowanie po każdym użyciu. • Termin ważności dotyczy

nienaruszonego opakowania wyrobu, który jest prawidłowo przechowywany. • Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. • Nie używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone. • Nie należy przyjmować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. • Wyrób należy używać zgodnie z instrukcjami. • Wyrób należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **Składniki:** Woda, ksylitol, gliceryna, wyciąg z płatków róży damasceńskiej, guma ksantanowa, polikarbofil, wodorotlenek sodu, sól sodowa kwasu hialuronowego, pektyny, sorbinian potasu, benzoesan sodu, stevia, pantenol, naturalne aromaty czerwonych owoców, wyciąg z liści aloesu zwyczajnego. **Producent:** Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: Bausch&Lomb Poland sp. z o.o. Aleja Szucha 13/1500-580 Warszawa

## Galeria

**SACHOL® KIDS** NA AFTY I AFTOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ U DZIECI\*

EKSTRAKT Z RÓŻY DAMASCEŃSKIEJ    SÓL SODOWA KWASU HIALURONOWEGO    PANTENOL

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**SACHOL® KIDS** NA AFTY I AFTOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ U DZIECI\*

LAGODZI BÓL!    DZIAŁA SZYBKO!    NIE WYWOŁUJE SZCZUŁA PIECZENIA!

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**SACHOL® KIDS** NA AFTY I AFTOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ U DZIECI\*

NIE WYWOŁUJE PIECZENIA!\*\*    NIE ZAWIERA PARABENÓW!\*\*    NIE ZAWIERA CUKRU!

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**SACHOL® KIDS**

Dzięki specjalnemu składowi!

- wykorzystuje skuteczne działanie barierowe,
- umożliwia szybkie zmniejszenie bólu w miejscu aftry, ułatwiając gojenie owrzodzenia.

Tubka z aplikatorem ułatwia precyzyjne i wygodne podanie preparatu.    Aromat czerwonych owoców jest przyjemny dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**SACHOL® KIDS**

DLA DZIECI powyżej 30 miesięcy

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.