OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Salinmed NaCl 0,9% roztwór soli fizjologicznej 5 ml x 50 sztuk

Cena: 16,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 amp. po 5 ml
Postać	-
Producent	TRADIX GROUP SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisSalinMed NaCl 0,9% jest odpowiedni dla niemowląt, dzieci i dorosłych:w higienie nosa: do zakraplania lub przemywania (płukania) suchego lub niedrożnego nosa;w higienie oczu: do zakraplania, płukania lub przemywania;w higienie uszu;do przemywania ran;do inhalacji w terapii aerozolowej.**Sposób użycia**Przed użyciem dokładnie umyć ręce.Odłączyć ampułkę jednorazową i odkręcić górną część, aby otworzyć.Do higieny nosa i oczu:Produkt można stosować codziennie do higieny nosa i oczu, w razie potrzeby od 1 do 6 razy dziennie.higiena nosa: zakraplanie lub płukanie suchego lub zatkanego nosa. Pochylić głowę na bok. Ostrożnie wprowadzić końcówkę jednorazowej ampułki do nozdrza i lekko ścisnąć. Powtórzyć czynnoś

z drugim nozdrzem. Przechylić głowę do pozycji pionowej, aby wydzielina mogła odpłynąć, a następnie wytrzeć jej nadmiar. Nie wydmuchiwać gwałtownie nosa w ciągu 10 minut po podaniu produktu. Zakrapiając produkt niemowlętom należy używać minimalnego nacisku, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego.higiena oczu: zakraplanie, przemywanie, płukanie. Wcisnąć kilka kropli roztworu do każdego oka. Wytrzeć nadmiar płynu sterylnym wacikiem. Nie dopuszczać do kontaktu ampułki jednorazowej z powierzchnią oka. Jeśli używany jest inny produkt do oczu, należy najpierw zastosować SalinMed NaCl 09,%, a następnie odczekaj 15 minut przed zakropleniem innego produktu. Roztwór może być stosowany także przez osoby noszące soczewki kontaktowe.Higiena uszu: płukanie. Dla prawidłowej higieny uszu, po zastosowaniu środka powierzchniowo czynnego, należy użyć produktu, aby usunąć rozpuszczony osad woskowiny oraz przepłukać zewnętrzny przewód słuchowy. Jedna ampułka może zostać użyta do obu uszu. Nadmiar płynu wytrzeć wacikiem. Przemywanie ran: Przepłukać ranę całą zawartością ampułki. Nadmiar roztworu ze zdrowej części skóry wytrzeć wacikiem. Nie dopuszczać do kontaktu ampułki jednorazowej z powierzchnią rany.Inhalacja w terapii aerozolowej: Jeśli roztwór jest używany jako rozpuszczalnik do inhalacji w terapii aerozolowej, należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną na produkcie do inhalowania. Jeśli roztwór jest używany samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną na urządzeniu do terapii aerozolowej. W przypadku stosowania po raz pierwszy lub w razie nadwrażliwości układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.

WażneProdukt jednorazowy do użytku osobistego. Po otwarciu należy natychmiast zużyć ampułkę jednorazową i wyrzucić po użyciu. Nie należy używać tej samej ampułki jednorazowej do różnych zastosowań. Nie należy stosować do iniekcji. Nie używać po upływie

terminu ważności. Nie używać, jeśli ampułka jednorazowa jest uszkodzona. Nie dopuszczać do kontaktu ampułki jednorazowej z oczami lub powierzchnią rany. Przechowywać w miejscu niedostępnych dla dzieci. Otwarta ampułka jednorazowa nie może być ponownie użyta: produkt nie zawiera konserwantów, dlatego ponowne użycie może wiązać się z ryzykiem podania zanieczyszczonego roztworu.SalinMed NaCl 0,9% jest sterylnym wyrobem medycznym klasy IIa.**Skład**Chlorek sodu ……. 0,9 gWoda oczyszczona ….. q.s. 100 ml. Nie zawiera konserwantów. **Producent**Tradix Group Sp. z o.o.Ul. Grzybowska 8700-844 Warszawa