

SEBIDIN INTENSIVE 20 tabletek do ssania

Cena: 20,75 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---|
| Dawka | 5mg+5mg |
| Opakowanie | 20 tabl. |
| Postać | tabl.do ssania |
| Producent | OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Chlorhexidini dihydrochloridum, Benzocainum |

Opis produktu

WskazaniaSEBIDIN INTENSIVE 20 tabletek do ssaniaLeczenie miejscowych objawów o umiarkowanym natężeniu w bezgorączkowym przebiegu infekcji jamy ustnej i gardła, którym towarzyszy ból.**Sposób użycia**Zalecana dawka to: 1 tabletko co 2 godziny. W ciągu doby można przyjąć maksymalnie 8 tabletek.**Ważne**Przeciwwskazaniajeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;u dzieci w wieku poniżej 12 lat;u pacjentów chorych na methemoglobinemę (chorobę krwi związaną z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny, niezdolnej do przyłączania i przenoszenia tlenu. Najczęstszym jej objawem jest sinica, powstająca w wyniku niedotlenienia tkanek).Działania niepożądaneDziałania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):podrażnienie czubka języka i błony śluzowej jamy ustnej.Działanie niepożądane, których częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych:methemoglobinemia (choroba krwi związana z występowaniem nieprawidłowej hemoglobiny);reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej;utrata apetytu;zaburzenia smaku (rzadko trwałe);zaburzenia oddychania, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła;brązowe przebarwienie zębów, języka, nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, pieczenie języka, mrowienie języka, zwiększone odkładanie się kamienia nazębnego;wysypka, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry;brązowe przebarwienie wypełnień dentystycznych, protez dentystycznych i innych aparatów stosowanych w jamie ustnej.**Skład**1 tabletko zawiera 5 mg chloroheksydyny dichlorowodoru i 5 mg benzokainy.Pozostałe składnikimanol, celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), powidon K29/32, magnezu stearynian, sodu cyklaminian (E 952), sodu sacharynian (E 954), aromat mentolowy 611072E, aromat pomarańczowy 90103-71.