

# SEPTANAZAL aerozol do nosa dla dorosłych 10 ml, katar, zatoki



Cena: 9,73 PLN

## Opis słownikowy

Producent	KRKA
Rodzaj rejestracji	Lek

**Szybko udrażnia nos**  
**Regeneruje śluzówkę**

## Opis produktu

**Wskazania** SeptaNazal dla dorosłych jest wskazany w celu zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej w nieżyście nosa oraz w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa, w leczeniu naczynioruchowego nieżyty nosa, w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. **Działanie** Postać farmaceutyczna Aerozol do nosa, roztwór (aerozol do nosa). Przezroczysty, bezbarwny roztwór. **Sposób użycia** Dawkowanie: Zalecana dawka SeptaNazal dla dorosłych to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, w razie potrzeby. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny stosować produkt leczniczy pod opieką dorosłych. Jeżeli po 3 dniach leczenia nie zauważono poprawy lub pogorszenia objawów należy ponownie dokonać oceny klinicznej. Dzieci powyżej 6 roku życia. Zalecana dawka SeptaNazal dla dorosłych u dzieci powyżej 6 roku życia to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do trzech razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem. SeptaNazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 roku życia. Sposób podawania. Należy usunąć nasadkę ochronną z końcówki rozpylającej. Przed pierwszym użyciem lub gdy aerozol nie jest stosowany przez dłuższy okres, należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę, do czasu pojawienia się jednolitej mgiełki. Końcówkę dozownika należy umieścić w otworze nosowym w pozycji na tyle pionowej, na ile to możliwe i nacisnąć pompkę dozownika. Podczas dozowania należy delikatnie wciągnąć powietrze nosem. Jeśli konieczne, czynność tę powtórzyć w drugim otworze nosowym. Po użyciu wytrzeć końcówkę dozującą chusteczką papierową i nałożyć nasadkę ochronną. **Ważne** Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Po przeklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym, w czasie którego odsłonięto oponę twardą. SeptaNazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 roku życia. **Skład** SeptaNazal dla dorosłych nie zawiera substancji konserwujących. Każdy ml roztworu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodoru i 50 mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodoru i 5,0 mg deksopantenolu.

Galeria

**SeptaNazal®**  
 Połączenie ksylometazoliny  
 z deksopantenolem zmniejsza niedrożność  
 nosa już od 1-szej minuty<sup>1</sup>

**KSYLOMETAZOLINA**  
**DEKSPANTENOL**

Szybko udrażnia nos → Regeneruje śluzówkę

1. Usmani N. Comparison of the efficacy and safety of the fixed dose combination of oxymetazoline and dexpanthenol compared to the individual products Oxymetazolin® and Dekspantenol® during a nasal congestion in patients with acute rhinitis. MedRxiv 2018; 27(5): 457-68. Available from: <https://doi.org/10.1101/2018.05.18.18121248>

KRICH

**SeptaNazal® ŁAGODZI**  
 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE OBJAWY  
 PRZY OSTRYM NIEŻYCIU NOSA:

Zaczerwieniona skóra wokół nosa  
 Kichanie  
 Podrażnienie  
 Katar  
 Wynioszona śluzówka  
 Pieczenie

KRICH

**SeptaNazal®**  
 szybko udrażnia  
 nos i regeneruje  
 śluzówkę

KRICH