

SEPTOLETE ULTRA aerozol do gardła 30 ml



Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek



- Przeciwbólowa
- Przeciwzapalna
- Antyseptyczna

Opis produktu

Wskazania Septolete ultra aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i antyseptyczny w leczeniu podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł i gardła oraz przed i po ekstrakcji zębów. **Działanie** Postać farmaceutyczna Aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny do żółtawego roztwór. **Sposób użycia** Dawkowanie. Dorośli: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem jeden do dwóch razy. Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 3-5 razy na dobę. Dla optymalnego działania, nie zaleca się stosowania produktu bezpośrednio przed lub po umyciu zębów. Nie należy przekraczać podanej dawki. Nie stosować produktu Septolete ultra przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni. Pacjenci w podeszłym wieku. Zalecane dawkowanie jest takie samo jak dla pacjentów dorosłych. Dzieci i młodzież. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden do dwóch razy. Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 3-5 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden raz. Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 3-5 razy na dobę. Septolete ultra jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Sposób podawania.** Przed pierwszym użyciem produktu Septolete ultra należy nacisnąć głowicę pompki rozpylającej z aerozolem kilka razy, aż do uzyskania jednolitej mgiełki. Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy okres czasu (co najmniej przez tydzień), należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden raz dla uzyskania jednolitej mgiełki. Przed użyciem należy zdjąć plastikowe wieczko. Otworzyć szeroko usta, nakierować aplikator w stronę gardła i nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem 1-2 razy. Podczas rozpylania leku należy wstrzymać oddech. Po każdym użyciu należy umieścić plastikowe wieczko na pompce rozpylającej. Jednorazowe naciśnięcie pompki rozpylającej powoduje uwolnienie 0,1 ml roztworu, zawierającego 0,15 mg chlorowodoru benzydamininy i 0,5 mg chlorku cetylopirydyniowego. **Ważne** Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie jest wskazana dla tej grupy wiekowej. **Skład** Każdy ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 1,5 mg chlorowodoru benzydamininy i 5 mg chlorku cetylopirydyniowego. Jedno naciśnięcie pompki rozpylającej powoduje rozpylenie 0,1 ml roztworu, zawierającego 0,15 mg chlorowodoru benzydamininy i 0,5 mg chlorku cetylopirydyniowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol: 267,60 mg/ml (26,76 mg/jedno naciśnięcie), hydroksystearnian makrogololicerolu: 2,5 mg/ml (0,25 mg/jedno naciśnięcie)

Galeria

▶ Ból gardła to **najczęstszy** objaw infekcji¹

▶ Nawet do **95%** przypadków zapalenia gardła spowodowanych jest przez **Wirusy**




1. Eccles R. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. Lancet Infect Dis. 2005; 5(1):75-82. 2. Alder C. Septoleta®: a fast-acting, unique, antiviral and treatment of viral infections. A four-nation online questionnaire survey. BMC Ear Nose Throat Disord 2012 Aug 16;12:8



Septoleta[®] ultra o potrójnej sile działania

- Chlorek cetylopirydyniowy
**ELIMINUJE PRZYCZYNY
INFEKCI**
- Benzydamina
ZMNIJSZA STAN ZAPALNY
- Benzydamina
SZYBKO ŁAGODZI BÓL

Chlorobenzylowa pochodna liczydziwego Septoleta ultra, 1,2 mg + 5 mg/ml, saszki do stosowania w jamie ustnej, opakowanie 20 szt. 01.10.2021



Septoleta[®] ultra o potrójnej sile działania



6+
BEZ CUKRU
BEZ GLUTENU

Chlorobenzylowa pochodna liczydziwego Septoleta ultra, 1,2 mg + 5 mg/ml, saszki do stosowania w jamie ustnej, opakowanie 20 szt. 01.10.2021

