

SEPTOLETE ULTRA o smaku cytryny i miodu 16 pastylek



Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka	3mg+1mg
Opakowanie	16 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzydamine hydrochloridum, Cetylpirydinii chloridum



- Przeciwbólowa
- Przeciwzapalna
- Antyseptyczna

Opis produktu

Wskazania SEPTOLETE ULTRA o smaku cytryny i miodu 16 pastylek Septolete ultra o smaku cytryny i miodu jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i antyseptyczny w leczeniu podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł i zapaleniu gardła. **Działanie** Postać farmaceutyczna Pastylka twarda. Okrągłe pastylki o ściętych brzegach i z chropowatą powierzchnią o barwie od jasnożółtej do żółtej. Białe plamki, nierównomierne zabarwienie, obecność pęcherzyków powietrza w twardej masie cukrowej i małe nierówności powierzchni. Średnica pastylki twardej: 18,0 mm - 19,0 mm, grubość: 7,0 mm - 8,0 mm. **Sposób użycia** Dawkowanie: Dorośli: Zalecane dawkowanie to 3 do 4 pastylek twardych na dobę. Pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin. Pacjenci w podeszłym wieku: Zalecana dawka jest taka sama jak dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież: Młodzież w wieku powyżej 12 lat: Zalecane dawkowanie to 3 do 4 pastylek twardych na dobę. Pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecane dawkowanie to 3 pastylki twarde na dobę. Pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Septolete ultra o smaku cytryny i miodu jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego bezpośrednio przed lub po umyciu zębów. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Septolete ultra o smaku cytryny i miodu może być stosowany do 7 dni. Sposób podawania. Pastylki twarde należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin. **Ważne** Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Skład** Każda pastylka twarda zawiera 3 mg chlorowodoru benzydaminu i 1 mg chlorku cetylopirydyniowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: izomalt (typ M) (E 953): 2452,8 mg na pastylkę twardą, benzoosan sodu (E 211): do 0,0009 mg na pastylkę twardą.

Galeria

▶ Ból gardła to **najczęstszy** objaw infekcji¹




▶ Nawet do **95%** przypadków zapalenia gardła spowodowanych jest przez **Wirusy**



1. Escher B. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. Lancet Infect Dis. 2005; 5(1):17-22. 2. Akbar O, Shajitha K. Evidence-based, timely and treatment of throat discomfort: a four-angle online questionnaire survey. BMC Ea Health Therapeut 2012 Aug; 16:128



Septolete[®] ultra o potrójnej sile działania

-  Chlorek cetylopirydyniowy
ELIMINUJE PRZYCZYNY INFEKcji (wirusy i bakterie)
-  Benzydamina
ZMNIJSZA STAN ZAPALNY
-  Benzydamina
SZYBKO ŁAGODZI BÓL

Chlorobenzylowy Pochłonięty Septolete ultra o smaku cytryny i między 3 mg + 1 mg, parafarmaceutyczny - 09.11.2022.



Działa **SZYBKO** i **DLUGO**^{*1}



*1 Już po 15 minutach i przez 3 godziny

1. Chlorobenzylowy Pochłonięty Septolete ultra o smaku cytryny i między 3 mg + 1 mg, parafarmaceutyczny - 09.11.2022.

