

Simetisan Control, 30 kapsułek

Cena: 10,49 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---------------------------|
| CE | 1434 |
| Opakowanie | 30 kaps. |
| Producent | SILESIA PHARMA SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny Simetisan Control

zawiera 240 mg symetykonu w kapsułce miękkiej żelatynowej składniki otoczki: żelatyna wieprzowa, glicerol nie zawiera cukru ani barwników

Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach. Simetisan Control zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, przez co ułatwia ich pękanie, a następnie wydalanie. Symetykon wykazuje działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne. Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną. Simetisan Control przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Sposób użycia

Kapsułki Simetisan Control stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picie napojów gazowanych.

Dorośli: doraźnie, 1 kapsułka, 2-4 razy dziennie. Maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).

Dzieci powyżej 12. roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego. Wyrób może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów. Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Ze względu na działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu, nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Składniki

240 mg symetykonu w kapsułce miękkiej żelatynowej.

Składniki otoczki: żelatyna wieprzowa, glicerol.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru ani barwników.

Ważne

Kiedy nie stosować wyrobu medycznego Simetisan Control:

w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu, u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12. roku życia.

Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Simetisan Control i innych preparatów. Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza. Brak dostępnych danych na temat wpływu wyrobu na obsługę maszyn oraz kierowanie pojazdami.