

SPUMAX WZDĘCIA 30 kapsułek



Cena: 7,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,125 g
Opakowanie	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)
Postać	kaps.miękkie
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Simeticonum

Opis produktu

WłaściwościWyrób medyczny Spumax wzdęcia jest stosowany w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa oraz w łagodzeniu objawów bólowych spowodowanych skurczem w dolnej części brzucha, bóle spowodowane gazami pooperacyjnymi oraz w zespole jelita drażliwego, a także w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np. badań radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.**Sposób użycia**Spumax wzdęcia należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji użycia.Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy mają Państwo wątpliwości.Niniejsze dawkowanie stosuje się, o ile lekarz nie zaleci inaczej. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zawsze stosować się do instrukcji użycia.W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:WiekPojedyncza dawkaDzienna dawkadorośli i młodzież od 14 roku życia1–2 kapsułki Spumax wzdęcia(odpowiadające 125–250 mg symetykonu)3–6 kapsułek Spumax wzdęcia(odpowiadające 375–750 mg symetykonu)W celu przygotowania do badania:WiekPojedyncza dawkaDzienna dawkadorośli i młodzież,dzieci od 6 roku życia2–3 kapsułki Spumax wzdęcia (odpowiadające 250–375 mg symetykonu)1 kapsułka Spumax wzdęcia(odpowiadająca 125 mg symetykonu)**Ważne**Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia**Składniki**1 miękka kapsułka żelatynowa zawiera125 mg symetykonu.Substancjami pomocniczymi są: żelatyna, 85% glicerol i żółcień chinolinowa (E104).**Producent**TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.Porto Officeul. Generała Bohdana Zielińskiego 2230-320 Kraków