

Spumax wzdęcia kapsułki miękkie 0,125g - 30 kapsułek

KRÓTKA DATA 31.12.2024

Cena: 7,99 PLN



Opis słownikowy

Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

OpisPRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI 31.12.2024 Spumax wzdęcia kapsułki miękkie 0,125g Co to jest SPUMAX WZDĘCIA i w jakich przypadkach się go stosuje?

Wyrób medyczny Spumax wzdęcia dostępny jest w formie miękkich kapsułek żelatynowych do stosowania doustnego. Wyrób medyczny Spumax wzdęcia jest stosowany: • w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa oraz w łagodzeniu objawów bólowych spowodowanych skurczem w dolnej części brzucha, bóle spowodowane gazami pooperacyjnymi oraz w zespole jelita drażliwego, • w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np. badań radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.

SkładnikiCo zawiera SPUMAX WZDĘCIA - skład:

Wyrób medyczny Spumax wzdęcia dostępny jest w formie miękkich kapsułek żelatynowych do stosowania doustnego. Jedna miękka kapsułka żelatynowa zawiera 125 mg symetykonu. Substancjami pomocniczymi są: żelatyna, 85% glicerol i żółcień chinolinowa (E104).

SkładnikiCo zawiera SPUMAX WZDĘCIA - skład:

Wyrób medyczny Spumax wzdęcia dostępny jest w formie miękkich kapsułek żelatynowych do stosowania doustnego. Jedna miękka kapsułka żelatynowa zawiera 125 mg symetykonu. Substancjami pomocniczymi są: żelatyna, 85% glicerol i żółcień chinolinowa (E104).

Wyrób medyczny SPUMAX WZDĘCIA – stosowanie:

Spumax wzdęcia należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy mają Państwo wątpliwości. Niniejsze dawkowanie stosuje się, o ile lekarz nie zaleci inaczej. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zawsze stosować się do instrukcji użycia. **Standardowe dawkowanie i sposób podania** W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych: dorośli i młodzież od 14 roku życia: • pojedyncza dawka: 1-2 kapsułki Spumax wzdęcia (odpowiadające 125-250 mg symetykonu) • dzienna dawka: 3-6 kapsułek Spumax wzdęcia (odpowiadające 375-750 mg symetykonu) Spumax wzdęcia powinien być zażywany w trakcie lub po posiłku. Kapsułki powinny być zażywane bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanką wody). Okres stosowania uzależniony jest od przebiegu zaburzeń. Jeśli to konieczne, Spumax wzdęcia może być stosowany przez dłuższy okres czasu. **W celu przygotowania do badania:** dorośli i młodzież, dzieci od 6 roku życia: • dzień przed badaniem: 2-3 kapsułki Spumax wzdęcia (odpowiadające 250-375 mg symetykonu) • rano w dniu badania: 1 kapsułka Spumax wzdęcia (odpowiadająca 125 mg symetykonu) W przypadku nieprzyjęcia Spumax wzdęcia, należy kontynuować stosowanie bez zmiany dawki.

Zanim zastosuje się SPUMAX WZDĘCIA: Nie należy stosować niniejszego wyrobu w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników Spumax wzdęcia. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: nie ma przeciwwskazań dla stosowania Spumax wzdęcia w okresie ciąży i karmienia piersią. Dzieci: Dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny przyjmować tego wyrobu w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów. Stosowanie Spumax wzdęcia wraz z innymi produktami leczniczymi: • Interakcje Spumax wzdęcia z innymi produktami leczniczymi są nieznanne. Wyrobu medycznego nie należy stosować po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego.

Możliwe działania niepożądane Działania niepożądane zgłoszone do tej pory i związane ze stosowaniem Spumax wzdęcia nie miały znaczenia klinicznego. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych prosimy o powiadomienie wytwórcy.

Ważne

Jak przechowywać SPUMAX WZDĘCIA? Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Pozostałe informacje: W przypadku powtarzających się lub długotrwałych dolegliwości żołądkowo-jelitowych prosimy skonsultować się z lekarzem w celu zdiagnozowania przyczyny tych dolegliwości oraz wprowadzenia odpowiedniego leczenia. Aktywny składnik Spumax wzdęcia prowadzi do zapadnięcia się spienionej treści żołądkowej wewnątrz przewodu pokarmowego wyłącznie w sposób fizyczny. Symetykon jest chemicznie i biologicznie całkowicie obojętny. Duże ilości symetykonu są również tolerowane bez jakichkolwiek problemów.

Podmiot odpowiedzialny:

TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.