

SPUMAX WZDĘCIA, symetykon 125 mg, 30 kapsułek

**aż 125 mg symetykonu
w jednej kapsułce!**

Cena: 8,38 PLN



Opis słownikowy


Dawka	0,125 g
Opakowanie	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)
Postać	kaps.miękkie
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Simeticonum

Opis produktu

Właściwości Wyrób medyczny Spumax wzdęcia dostępny jest w formie miękkich kapsułek żelatynowych do stosowania doustnego. Wyrób medyczny Spumax wzdęcia jest stosowany: • w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa oraz w łagodzeniu objawów bólowych spowodowanych skurczem w dolnej części brzucha, bóle spowodowane gazami pooperacyjnymi oraz w zespole jelita drażliwego, • w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np. badań radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii. **Sposób użycia** Spumax wzdęcia należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy mają Państwo wątpliwości. Niniejsze dawkowanie stosuje się, o ile lekarz nie zaleci inaczej. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zawsze stosować się do instrukcji użycia. Standardowe dawkowanie i sposób podania W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych: dorośli i młodzież od 14 roku życia: pojedyncza dawka: 1-2 kapsułki Spumax wzdęcia (odpowiadające 125-250 mg symetykonu) dzienna dawka: 3-6 kapsułek Spumax wzdęcia (odpowiadające 375-750 mg symetykonu) Spumax wzdęcia powinien być zażywany w trakcie lub po posiłku. Kapsułki powinny być zażywane bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanką wody). Okres stosowania uzależniony jest od przebiegu zaburzeń. Jeśli to konieczne, Spumax wzdęcia może być stosowany przez dłuższy okres czasu. W celu przygotowania do badania: dorośli i młodzież, dzieci od 6 roku życia: dzień przed badaniem: 2-3 kapsułki Spumax wzdęcia (odpowiadające 250-375 mg symetykonu) rano w dniu badania: 1 kapsułka Spumax wzdęcia (odpowiadająca 125 mg symetykonu) W przypadku nieprzyjęcia Spumax wzdęcia, należy kontynuować stosowanie bez zmiany dawki. **Ważne** Zanim zastosuje się SPUMAX WZDĘCIA: Nie należy stosować niniejszego wyrobu w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników Spumax wzdęcia. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: nie ma przeciwwskazań dla stosowania Spumax wzdęcia w okresie ciąży i karmienia piersią. Dzieci: Dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny przyjmować tego wyrobu w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów. Stosowanie Spumax wzdęcia wraz z innymi produktami leczniczymi: Interakcje Spumax wzdęcia z innymi produktami leczniczymi są nieznane. Wyrobu medycznego nie należy stosować po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego. Możliwe działania niepożądane Działania niepożądane zgłoszone do tej pory i związane ze stosowaniem Spumax wzdęcia nie miały znaczenia klinicznego. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych prosimy o powiadomienie wytwórcy. Jak przechowywać SPUMAX WZDĘCIA? Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Pozostałe informacje: W przypadku powtarzających się lub długotrwałych dolegliwości żołądkowo-jelitowych prosimy skonsultować się z lekarzem w celu zdiagnozowania przyczyny tych dolegliwości oraz

wprowadzenia odpowiedniego leczenia. Aktywny składnik Spumax wzdęcia prowadzi do zapadnięcia się spienionej treści żołądkowej wewnątrz przewodu pokarmowego wyłącznie w sposób fizyczny. Symetykon jest chemicznie i biologicznie całkowicie obojętny. Duże ilości symetykonu są również tolerowane bez jakichkolwiek problemów. **Składniki** Wyrób medyczny Spumax wzdęcia dostępny jest w formie miękkich kapsułek żelatynowych do stosowania doustnego. Jedna miękka kapsułka żelatynowa zawiera 125 mg symetykonu. Substancjami pomocniczymi są: żelatyna, 85% glicerol i żółcień chinolinowa (E104). **Producent** Wytwórca: Catalent Germany Eberbach GmbH, Gammelbacher Straße 2, 69412 Eberbach, Niemcy. **Dystrybutor:** Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

Galeria



SPUMAX® WZDĘCIA

wyrób medyczny

ULGA
 Szybka ulga przy wzdęciach,
 uczuciu pełności i niestrawności.

Pomaga w łagodzeniu objawów
 żołądkowo-jelitowych spowodowanych
 nadmiernym gromadzeniem się gazów
 takich jak wzdęcia, uczucie pełności,
 odbijanie, niestrawność czynnościowa.

Przebieg choroby - Symetikon jest substancją fizycznie obojętną, nie powodującą uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



KOMFORT
 Miła kapsułka, łatwa do połknięcia.

Przebieg choroby - Symetikon jest substancją fizycznie obojętną, nie powodującą uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SPUMAX® WZDĘCIA

wyrób medyczny

DAWKOWANIE (dorośli i młodzież od 14. roku życia)
 w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:

pojedyncza dawka:
 1-2 kapsułki (co odpowiada 125-250 mg)

dzienna dawka:
 3-6 kapsułek (co odpowiada 375-750 mg)

bezpieczny
 w okresie ciąży i karmienia piersią

Przebieg choroby - Symetikon jest substancją fizycznie obojętną, nie powodującą uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jest to substancja czynna, która działa wyłącznie w sposób fizyczny, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.