

TADALAFIL MENSIL 10 mg 2 tabletki powlekane



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--|
| Dawka | 10 mg |
| Opakowanie | 2 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Tadalafilum |

Opis produktu

OpisTadalafil MENSIL 10 mg jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, w którym mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Wykazano, że tadalafil znacząco poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Tadalafil MENSIL zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Po stymulacji seksualnej, Tadalafil MENSIL pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W rezultacie dochodzi do poprawy erekcji. Tadalafil MENSIL nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek Tadalafil MENSIL nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji. **Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Dorośli mężczyźni:** Zalecana dawka to jedna tabletkę 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu. Lek Tadalafil Mensil może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Leku Tadalafil Mensil nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. **Ważne**Nie wolno stosować produktu Tadalafil Mensil u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. Ponadto, stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących grupach pacjentów: w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu, pacjenci jednocześnie zażywający organiczne azotany (patrz punkt 4), pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli zawał mięśnia sercowego lub udar, pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych, pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association), pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, pacjenci, którzy utracili wzrok w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5, pacjenci stosujący jednocześnie leki pobudzające cyklazę guanylową, takie jak riocygua. **Skład**Substancją czynną leku jest tadalafil. Każda tabletkę leku zawiera 10 mg tadalafilu. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian; Otoczek tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogl 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172). **Producent**, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-

LEK" S.A.ul. Żmigrodzka 242 EWrocław