

## TASECTAN DLA DZIECI 250 mg 20 saszetek

**Tasectan® na biegunkę**

Cena: 28,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,25 g
Opakowanie	20 sasz.
Postać	saszet.
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis

CO WYRÓŻNIA TASECTAN® UNIKALNA FORMUŁA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA KOGO? JAK STOSOWAĆ? SZCZEGÓŁY PRODUKTU

CO WYRÓŻNIA :

Łagodzi objawy biegunki takie jak: częste wypróżnienia i napięcie powłok brzusznych.

Tasectan 250 mg w postaci proszku w saszetkach zalecany jest szczególnie dzieciom, nawet poniżej 3. roku życia.

Jest łatwy w podaniu – nawet małym dzieciom.

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Tasectan zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.1-4

#### UNIKALNA FORMUŁA

Unikalna formuła na biegunkę NEO\* zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelita.

#### NORMALIZUJE

Przywraca fizjologiczne funkcje ścian jelita.

#### ELIMINUJE

Łagodzi objawy biegunki o różnej etiologii, takie jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin.

#### OCHRAMIA

Tworzy warstwę chroniącą błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

\* NEO - nazwa formuły stanowi skrót procesów związanych z właściwościami wyrobu medycznego opisanych w IFU.

## SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADANIACH KLINICZNYCH:

KORZYSTNY PROFIL BEZPIECZEŃSTWA<sup>1,3</sup>

DLA KOGO W POSTACI SASZETEK?

Tasectan® 250 mg to produkt przeciwbiegunkowy, który można stosować u dzieci poniżej 14. roku życia w celu łagodzenia objawów biegunki różnego pochodzenia. Produkt może być stosowany również u dzieci poniżej 3. roku życia.

JAK STOSOWAĆ W POSTACI SASZETEK?

Dzieci poniżej 3 roku życia 1 saszетка co 6 godzin, do ustąpienia objawów Dzieci w wieku od 3 do 14 lat 1-2 saszетки co 6 godzin, do ustąpienia objawów

ma neutralny smak

może być zmieszany z dowolnym napojem, jogurtem lub inną żywnością

to niewielka ilość proszku do podania

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ DLA DOROSŁYCH I DZIECI OD 14. ROKU ŻYCIA:

Carretero JE, Reguera FD, Álvarez SL, Montes JL. A comparative analysis of response to ORS (oral rehydration solution) vs. ORS + gelatin tannate in two cohorts of pediatric patients with acute diarrhea. *Rev Esp Enferm Dig* 2009;(101):41-48 Torres-Herrera J, Torres-Ruiz G. Gelatin Tannate: A Selective Biofilm-Forming, Gut Mucoprotectant for Acute Gastroenteritis in Children. A Short Narrative Review. *Current Drug Therapy*, 2017, 12, 23-28 Ulotka dla użytkownika Tasectan® 250 mg i 500 mg Lopetuso LR, Scaldaferrri F, Bruno G, Petito V, Franceschi F, Gasbarrini A. The therapeutic management of gut barrier leaking: the emerging role for mucosal barrier protectors. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*. 2015;19:1068-76.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYROBIE MEDYCZNYM

Tasectan® 250 mg, proszek do stosowania u dzieci, 20 saszetek

#### Zastosowanie:

Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita. Jego skład został specjalnie opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin. W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

#### Skład:

250 mg taninianu żelatyny (pochodzenia wieprzowego).

#### Instrukcja użycia:

Zawartość jednej saszetki należy mieszać z niewielką ilością niezbyt gorącego napoju takiego jak mleko, sok owocowy lub woda i natychmiast podać. Można ją również dodać do jogurtu lub jakiegokolwiek innej żywności. Nie należy podawać produktu bezpośrednio, bez mieszania go z żywnością.

#### Dawkowanie:

Dzieci poniżej 3 roku życia: 1 saszetka co 6 godzin, do ustąpienia objawów Dzieci w wieku od 3 do 14 lat: 1–2 saszetki co 6 godzin, do ustąpienia objawów

#### Ostrzeżenia:

Konsultacja medyczna przed zastosowaniem tego produktu nie jest konieczna, niemniej jest ona zalecana w przypadku ciężkich lub uporczywych objawów lub w przypadku wątpliwości co do rozpoznania choroby. W przypadku biegunki u dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów. Stosowanie tego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez fachowy personel medyczny, ten wyrób medyczny może być stosowany jednocześnie z leczeniem farmakologicznym. Zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów oraz postępowanie dietetyczne odpowiednie dla pacjentów z biegunką. Pomimo braku znanych zdarzeń niepożądanych nie poleca się stosowania tego produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, o ile lekarz nie zadecyduje inaczej. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Nie należy stosować produktu w przypadku gdy blister lub saszetka są otwarte lub uszkodzone. Ten wyrób medyczny nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Przeciwwskazania:

Tasectan nie powinien być stosowany u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiegokolwiek inne składniki produktu.

#### Opakowanie:

Opakowanie zawiera 20 saszetek

#### Inne informacje:

#### Producent:

Noventure, S.L.

Podmiot prowadzący reklamę produktu:

Bausch Health Poland sp. z o.o. NIP: 813 36 76 203

Tas-PL-2304-101

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Opisto** wyrób medyczny na biegunkę u dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia o udowodnionej skuteczności, zmniejsza częstotliwość i czas trwania biegunki. Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita. Jego

skład został opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin. W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki. **Sposób użycia** Kapsułkę należy połączyć, popijając wodą. Dawkowanie Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1-2 kapsułki co 4-6 godzin, do ustąpienia objawów. **Skład** saszetka preparatu zawiera 250g taninianu żelatyny. **Ważne** Tasectan nie powinien być stosowany u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiegokolwiek inne składniki produktu. **Producent** Producent: Noventure, S.L. Avenida Diagonal, 549, 5a planta 08029 Barcelona - Hiszpania Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 235-959 Rzeszów

## Galeria

### CO WYRÓŻNIA Tasectan®:

- Łagodzi objawy takie jak:** częste wypróżnienia i napięcie powłok brzusznych.
- Tasectan® 250 mg w postaci proszku** jest dzieciom zalecany **już od 3. roku życia.**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### CO WYRÓŻNIA Tasectan®:

- Jest łatwy w podaniu** – nawet małym dzieciom.
- Skuteczność i bezpieczeństwo Tasectanu** zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.<sup>1,4</sup>

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę **NEO®** zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelit.

**ELIMINUJE** **OCHRONIA** **NORMALIZUJE**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę **NEO®** zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelit.

- NORMALIZUJE** Przywraca fizjologiczne funkcje ścian jelita.
- ELIMINUJE** Łagodzi objawy biegunki o różnej etiologii, takie jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin.
- OCHRONIA** Tworzy warstwę chroniącą błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

**POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADANIACH KLINICZNYCH:**

**Tasectan®** istotnie łagodzi objawy biegunki u dzieci po 12 godzinach leczenia.<sup>1,2</sup>

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

**POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADANIACH KLINICZNYCH:**

Redukcja liczby stolców u dzieci w grupie otrzymującej DPN wyniosła **18,9%** w porównaniu z **60,2%** w grupie otrzymującej DPN + Tasectan®.<sup>1,2</sup>

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

**KORZYSTNY PROFIL BEZPIECZEŃSTWA<sup>1,2</sup>**

- Tworzy cienką **błonię chroniącą ścianę jelita<sup>3</sup>**
- Kompleks nie jest wchłaniany do krwiobiegu<sup>4</sup>**
- Nie powoduje znanych zdarzeń niepożądanych<sup>5</sup>**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### DLA KOGO Tasectan® W POSTACI SASZETEK?

**Tasectan® 250 mg to produkt przeciwbiegunkowy, który można stosować u dzieci poniżej 14. roku życia w celu łagodzenia objawów biegunki różnego pochodzenia. Produkt może być stosowany również u dzieci poniżej 3. roku życia.**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### SPRAWDŹ RÓWNIEŻ Tasectan® DLA DOROSŁYCH I DZIECI OD 14. ROKU ŻYCIA:

**Tasectan 500 mg kapsułki**

**SPRAWDŹ**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### JAK STOSOWAĆ Tasectan® W POSTACI SASZETEK?

- ma neutralny smak
- może być zmieszany z dowolnym napojem, jogurtem lub inną żywnością
- to niewielka ilość proszku do podania

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

### JAK STOSOWAĆ Tasectan® W POSTACI SASZETEK?

**Tasectan 250 mg**

**Dzieci poniżej 3 roku życia**  
1 saszetka co 6 godzin, do ustąpienia objawów

**Dzieci w wieku od 3 do 14 lat**  
1-2 saszetki co 6 godzin, do ustąpienia objawów

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**