OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

TEST Infekcje układu moczowego 4 parametry DIATHER

Cena: 19,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisTEST Infekcje układu moczowego 4 parametry DIATHERTEST INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO (1 test) domowy, paskowy test do wykrywania 4 parametrów: leukocyty, krew, azotyny, białko w próbce moczuZASTOSOWANIESzybki test przeznaczony jest do wykrywania obecności 4 parametrów: leukocytów, krew, azotyny oraz białko w moczu, wynik otrzymujemy zaledwie w 2 minuty.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUTEST INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO przeznaczony jest do wykrywania 4 parametrów leukocytów, krew, azotyny oraz białko w moczu, test należy wykonać w przypadku wystąpienia objawów takich jak: uczucie parcia na pęcherz przy jednoczesnej niemożności oddania moczu lub wydalaniu bardzo niewielkiej ilości moczu, piekący ból przy oddawaniu moczu, mocz mętny, o nieprzyjemnym zapachu, gorączka, złe samopoczucie, ból w okolicy lędźwiowej.WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTUból podbrzuszapieczenieczęstomoczprzed szczepieniemSTRESZCZENIEInfekcje układu moczowego są jedną z najczęstszych przyczyn interwencji lekarskich, występują nawet 50 razy częściej u kobiet niż wśród mężczyzn, z największą częstością w wieku 16-35 lat. U 30-44% po pierwszym incydencie występuje nawrót choroby zwykle w ciągu 3 miesięcy, a u prawie 50% w ciągu 12 miesięcy. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym infekcji jest Escherichia coli, Proteus mirabilis czy Klebsiella spp. Wyróżnia się kilka grup klinicznych klasyfikacji zakażeń układu moczowego (ZUM): kobiety z niepowikłanym zapaleniem pęcherza moczowego, z nawracającym niepowikłanym zapaleniem pęcherza moczowego, z niepowikłanym ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, kobiety i mężczyźni z niepowikłanym zapaleniem pęcherza jak również nerek lub stercza, z powikłanym ZUM, oraz z bezobjawowym bakteriomoczem. Infekcje układu moczowego o przebiegu niepowikłanym dotyczą osób bez żadnej choroby i wady układu moczowego. ZUM o przebiegu powikłanym dotyczy osób o nieprawidłowościach w obrębie układu moczowego, cukrzyków, mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego czy kobiet w ciąży. W warunkach prawidłowych mocz w pęcherzu moczowym, moczowodach, kielichach nerkowych jest jałowy. Do zakażenia dochodzi zwykle drogą wstępującą, a typowym pierwszym etapem zakażenia jest kolonizacja okolicy ujścia cewki moczowej, a następnie przedostanie się drobnoustrojów z cewki moczowej do pęcherza moczowego. Przemieszczenie się bakterii z cewki do pęcherza moczowego u kobiet następuje np. podczas stosunku płciowego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo ujścia pochwy, odbytnicy i ujścia cewki moczowej ryzyko zakażenia u kobiet jest wielokrotnie większe. Klasycznymi objawami ZUM jest ból podczas oddawania moczu oraz pieczenie, częstomocz, silne uczucie parcia na pęcherz przy jednoczesnej niemożności oddania moczu lub wydalanie bardzo niewielkiej ilości moczu, oraz gorączka oraz dreszcze. Na infekcje dróg moczowych może wskazywać obecność w moczu białka, krwi, azotynów i/lub podwyższona liczba leukocytów. Nie należy bagatelizować infekcji dróg moczowych, gdyż nieleczone bądź zaniedbane mogą przejść w stan przewlekły. TEST INFEKCJE DRÓG MOCZOWYCH pozwala na wczesne wykrycie infekcji i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, zwiększając tym samym szanse pacjenta na szybkie i skuteczne wyleczenie.OPAKOWANIE

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

ZAWIERA1 saszetka z paskiem testowym1 pojemnik na moczinstrukcja użycia - Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE. - Posiada deklarację zgodności UE. - Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.